

**Präoperative Anxiolyse - ein Vergleich
zwischen Promethazin/Pethidin
und Lormetazepam**

Christine Kurpiers



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41554617_0025

Aus dem Institut für Anästhesiologie der Universität München

Direktor: Prof. Dr. med. K. Peter

Bereich Poliklinik

Vorstand: Prof. Dr. med. A. Doenicke

Präoperative Anxiolyse - ein Vergleich zwischen

Promethazin/Pethidin und Lormetazepam

Dissertation

zum Erwerb des Doktorgrades der Medizin

an der Medizinischen Fakultät der

Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Christine Kurpiers

aus

Moosburg

1987

Mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität München

Berichterstatter: Prof. Dr. med. A. Doenicke

Mitberichterstatter: Prof. Dr. med. J. Kugler

Mitbetreuung durch den
promovierten Mitarbeiter: Dr. med. A. Stopfinger

Dekan: Prof. Dr. med. W. Spann

Tag der mündlichen Prüfung: 21.05.1987

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	2
2.	Angst	4
2.1.	Der Begriff Angst	4
2.1.1.	Beschreibung des Phänomens "Angst"	4
2.1.2.	Neurophysiologische Repräsentation der Angst	8
2.1.3.	Die präoperative Angst, ihre Folgen und Möglichkeiten zu ihrer Reduktion	10
2.2.	Messung der Angst	14
2.2.1.	Angstfragebogen situativ	17
2.2.2.	Repressions-Sensitizations-Skala	19
2.2.3.	STAI-G-X2	21
2.2.4.	Erlanger Angstskala - Situativ	22
2.2.5.	Angst - Visuelle Analogskala	23
3.	Versuchsdurchführung	24
3.1.	Pilotstudie	24
3.2.	Medikamente	25
3.2.1.	Promethazin (Atosil ^R)	25
3.2.2.	Pethidin (Dolantin ^R)	27
3.2.3.	Lormetazepam (Noctamid ^R)	30
3.2.4.	Akzeptanz der Applikationsform der Medikamente	33
3.3.	Datenerhebung	34
3.3.1.	Versuchsaufbau	34
3.3.2.	Versuchsablauf	36
3.4.	Statistische Auswertung	38

4.	Ergebnisse	39
4.1.	Anamnesedaten	39
4.2.	Angstfragebogen situativ	40
4.3.	Repressions-Sensitizations-Skala	41
4.4.	STAI-G-X2	42
4.5.	Erlanger Angstskala - Situativ	43
4.6.	Angst - Visuelle Analogskala	45
4.7.	Akzeptanz der Applikationsform der Medikamente	48
5.	Diskussion	51
5.1.	Ausgangssituation der beiden Medikations- gruppen	51
5.2.	Entwicklung der situativen Angst	53
5.3.	Akzeptanz der Applikationsform	57
5.4.	Zusammenfassende Bewertung der Studie	58
6.	Zusammenfassung	59
7.	Anhang - Abbildungen/Tabellen	60
8.	Literaturverzeichnis	95

Thema :

Präoperative Anxiolyse - ein Vergleich zwischen
Promethazin/Pethidin und Lormetazepam

1. Einleitung

Angst ist eine Emotion, die den Patienten in der präoperativen Phase begleitet. Sie bewirkt eine Veränderung des Denkens und Handelns, um einer Gefahr wirksam begegnen zu können. In der besonderen Situation vor der Operation stehen dem Patienten Bewältigungsmöglichkeiten wie Flucht und Abwehr als angemessene Lösung nicht zur Verfügung.

Um ungünstige Auswirkungen der präoperativen Angst zu vermeiden, sind Maßnahmen zur Verminderung oder Hilfen zur Bewältigung der Angst notwendig. Dies ist in besonderer Weise Aufgabe der präoperativen Anästhesievisite, die durch einfühlsame Aufklärung und Beratung darauf abzielen sollte, den Patienten auf Narkose und Operation vorzubereiten (32,114). Daneben hat sich der Einsatz von Pharmaka bewährt, um die Angst des Patienten zu verringern. Anxiolyse und nicht nur Sedierung sollte das Hauptziel der Prämedikation sein.

In der letzten Zeit gewinnt die orale Prämedikation als Alternative zur intramuskulären Prämedikation immer mehr an Bedeutung (31,39,49,61). Abgelehnt wird in vielen Abteilungen die orale Prämedikation wegen des Gebots der Nüchternheit in den letzten Stunden vor der Operation. Dieses Gebot wird sicher überbewertet (16,50,92).

Mit der neuen galenischen Zubereitung des Benzodiazepins Lormetazepam in Form einer Oblate, die sublingual oder buccal verabreicht wird, können die Vorteile der oralen Prämedikation bei völliger Nüchternheit des Patienten genutzt werden. Auf die unter Umständen unangenehme Injektion kann verzichtet werden.

In der vorliegenden Arbeit werden unter standardisierten Bedingungen in einer Doppelblindstudie die Wirkungen der herkömmlichen, intramuskulären Prämedikation von Promethazin und Pethidin mit denen von Lormetazepam in der Verabreichungsform einer Oblate verglichen. Untersucht werden die Wirkung der Medikation auf die Patienten und die Akzeptanz der Applikationsform durch die Patienten und durch das medizinische Pflegepersonal.

2. A n g s t

2.1. D e r B e g r i f f A n g s t

2.1.1. B e s c h r e i b u n g d e s P h ä n o m e n s

" A n g s t "

Angst gilt im allgemeinen als Oberbegriff für alle Furcht-, Schreck-, Angst- und Streßzustände; sie ist ein natürlicher Schutzmechanismus vor jeglicher Gefährdung des Organismus (87). Sie bewirkt eine Veränderung der körperlichen Verfassung, des Denkens und des Handelns, um einer Gefahr, wenn möglich, angemessen begegnen zu können.

Der Begriff steht für ein emotionales Reaktionssyndrom, das durch die Wahrnehmung einer Bedrohung physischer oder psychischer Art ausgelöst wird (12,14); es kommt im Subjektiven zu einem Gefühl der Erregung und der Beklemmung, im Körperlichen zu einer Erregung des sympathischen Nervensystems und im gedanklichen, motorischen Bereich zur Lösungssuche, welche von einer Handlungsblockierung begleitet sein kann; als Lösungsmöglichkeiten kommen Angriff, Flucht, Ausharren in der Gefahr und Aufgabe in Frage (13). Die entsprechenden Reaktionen können auf unterschiedlichen Meßebenen untersucht werden: in der subjektiv-verbalen, in der motorisch-verhaltensmäßigen und in der physiologischen Ebene. Als Angstreaktionen, die durch stimulierende Situationen ausgelöst werden, gelten in der subjektiv-verbalen Ebene Selbstbeschreibungen der betroffenen Personen; in der motorisch-verhaltensmäßigen Ebene sind die Indikatoren der Angst allgemeine Unruhe

und Koordinationsstörungen, Zittern der Stimme, Artikulationsstörungen, Verhaltensweisen, die Vermeidungsverhalten charakterisieren, Defizite bei komplexen kognitiven Leistungen und eine verkrampfte Körperhaltung; zu den physiologischen Angstreaktionen zählen die Erhöhung der Herzfrequenz, des Blutdruckes, der Atemfrequenz, die Veränderungen der Spannung der quergestreiften Muskulatur und der Höhe des elektrischen Hautwiderstandes, die Schweißsekretion, die Pupillenmotorik und die Erregung der Effektororgane des sympathischen Nervensystems; außerdem kommt es zu humoralen Veränderungen: zu einem Anstieg der Blutkonzentration des Adrenalins, des Cortisols und der freien Fettsäuren (45,63,76,116).

Angstreaktionen entstehen nach dem Modell der klassischen Konditionierung (89,94); sie sind erlern- und verlernbar.

Bei dem Versuch, Angst zu bewältigen, kommt es zu individuell unterschiedlichen Prozessen, welche die Kontrolle einer Angsterregung bezwecken; solche Prozesse werden Angstabwehrmechanismen genannt (34,65). Es werden adäquate und inadäquate Mechanismen zur Angstabwehr unterschieden. Der normalen, adäquaten Angstabwehr, d.h. einer gedanklich realistischen Auseinandersetzung, werden zwei Formen von inadäquater Angstabwehr gegenübergestellt: zum einen eine Form, die sich mit Verleugnung bzw. Verdrängung der Angst umschreiben läßt, zum anderen eine Form, die durch Isolierung, Intellektualisierung und Kompensation der Angst gekennzeichnet ist. Letztere Mechanismen führen zu einer, der Situation nicht angepassten Beunruhigung. In der Literatur (15,65) wird die erste Form als Repression, die zweite als Sensitization angesprochen.

Von Bedeutung ist außerdem die Aufteilung der Angst in zwei Qualitäten (17,45,103): in die Angst als transitorischem, situationsbedingtem, momentanem Zustand ("state"-Angst) und in die Angst als relativ stabiler Persönlichkeitseigenschaft, also einer Art Grundängstlichkeit ("trait"-Angst).

Die "state"-Angst ist die Angst, die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegt, in ihrer Ausprägung variabel ist, vorübergeht und einer definierten Zeitperiode zugeordnet werden kann; sie tritt als eine Funktion entsprechender, auf den Organismus einwirkender Angststimuli auf. Durch sie werden Abwehr- oder Fluchtreaktionen ausgelöst, welche den Organismus vor Schädigungen oder dem Tod bewahren (35).

Die "trait"-Angst ist die bei einem Individuum latent vorkommende Angst, die durch geeignete Angststimuli aktiviert wird; sie beinhaltet die je nach Individuum unterschiedliche Disposition, auf angsterregende Stimuli mit einem gewissen Reaktionstyp zu antworten; Personen mit hoher Angstbereitschaft reagieren mit einer intensiveren "state"-Angst als Personen mit niedriger Angstbereitschaft (46). Die "trait"-Angst stellt ein überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal dar (88).

Zur Erklärung der Entstehung der "state"-Angst wurden zwei Theorien entwickelt: die kognitive Theorie und die Aktivierungstheorie.

Zur "state"-Angst kommt es nach der kognitiven Theorie (36,55,73,104) durch Beurteilung der Angststimuli hinsichtlich ihrer Bedrohlichkeit; hierbei ist auch der Umfang der "trait"-Angst von Bedeutung. Die Bewertung des Bedrohlichkeitsgrades ist davon

abhängig, inwieweit der Umfang der Angststimuli klar erkannt werden kann und inwieweit geeignete Reaktionsmöglichkeiten zur Lösung der Situation zur Verfügung stehen; "state"-Angst entsteht nach dieser Theorie also in Folge der Beurteilung der Situation und der Beurteilung der für eine Lösung zur Verfügung stehenden Reaktionsmöglichkeiten. Die Intensität des Angstzustandes ist von dieser Bewertung abhängig.

Nach der Aktivierungstheorie bedarf es über die Verhältnisse hinaus, die die kognitive Theorie anspricht, noch eines bestimmten Aktivierungsgrades des Organismus. Nach dieser Theorie ergibt sich die "state"-Angst erst aus dem Zusammentreffen zweier Komponenten:

1. dem Vorhandensein einer hohen physiologischen Aktivierung des zentralen Nervensystems und
2. der entsprechenden Bewertung der Situation im Sinne eines Angststimulus (89,108).

Die Erregung des zentralen Nervensystems bewirkt eine unspezifische Emotion und eine Reihe physiologischer Angstreaktionen. Die Wahrnehmung dieser physiologischen, körperlichen Erscheinungen kann im Sinne eines positiven feedback-Mechanismus ihrerseits die Emotion verstärken, d.h. die Angst vergrößern (88).

2.1.2. Neurophysiologische

Repräsentation der Angst

Psychische Phänomene sind an anatomische Strukturen und an biochemische Stoffwechselvorgänge in diesen Strukturen gebunden.

Als anatomisches, neurophysiologisches Korrelat der Entstehung von Affekten und Emotionen und damit der Angst wird das limbische System angesehen. Es stellt einen Teil des Telencephalons dar und ist entwickungsgeschichtlich der älteste Teil der Hirnrinde. Zum limbischen System gehören Hippocampus, Insula, Gyrus cinguli, Nucleus amygdale, Nucleus septi und Corpus mamillare. Durch Elektrostimulation in Strukturen des limbischen Systems (Locus coeruleus) werden bei Primaten Verhaltensreaktionen und vegetative Symptome hervorgerufen, die als Angstreaktion interpretiert werden (97,110). Die Verbindung Hippocampus - Corpus mamillare - Thalamus anterior - Gyrus cinguli - Hippocampus stellt einen geschlossenen Neuronenkreis dar. In ihm können Erregungen längere Zeit bestehen bleiben und sich verstärken, so daß es zu Affektentladungen z.B. bei extremen Angstzuständen kommt (10). Durch die Verbindung zum Hypothalamus, einem Teil des Diencephalons, kann das limbische System die vegetativen und neuroendokrinen Zentren beeinflussen. Auch bei elektrischen Reizungen im caudalen Hypothalamus kommt es bei Katzen zu Abwehr- und Fluchtreaktionen. In den genannten Strukturen laufen biochemische Reaktionen ab, die in Verbindung mit der Reaktion Angst stehen. Diese Vorgänge werden über Rezeptoren ver-

mittelt; zu nennen sind die Noradrenalin- und besonders die Benzodiazepin-Rezeptoren, die ausschließlich im ZNS gefunden werden (81). Es gibt Hinweise, daß diese zusammen mit Gamma-Aminobuttersäure (GABA)-Rezeptoren eine multifunktionelle Einheit bilden und beim Angstgeschehen eine bedeutende Rolle spielen (63).

2.1.3. Die präoperative Angst, ihre Folgen und Möglichkeiten zu ihrer Reduktion

In der präoperativen Situation kommt es zu einer Entwicklung von Angst, da für den Patienten, zumindest subjektiv, eine physische Bedrohung besteht. Zusätzlich ist in dieser Situation der Handlungsraum des Patienten eingeschränkt.

Unmittelbar vor der Operation (1-2 Tage) ist die "state"-Angst deutlich erhöht; sie nimmt postoperativ wieder ab (2,57,79,105,124).

Die Ursachen der präoperativen Angst sind vielfältig. Ein bevorstehender operativer Eingriff impliziert eine physische Gefährdung, der Klinikaufenthalt per se kann die Ursache sein und die Angst vor der Anästhesie (22,24,44,70,96,99,100,106).

Die Angst vor dem operativen Eingriff beinhaltet die Angst vor der Operation als Verletzung und Verstümmelung des Körpers, vor der Nachbehandlung, dem Ergebnis des Eingriffes und vor Kunstfehlern; die Intensität der präoperativen Angst ist jedoch nicht abhängig von der Art und Schwere des operativen Eingriffes (2,14,54).

Der Klinikaufenthalt kann auf Grund des Verlustes der freien Selbstverfügbarkeit, der Trennung von der gewohnten Umgebung und des möglicherweise unpersönlichen Routinebetriebes präoperative Angst verursachen (77).

Besonders häufig ist Angst vor der Anästhesie Ursache

für die präoperative Angst; es ist die Angst vor dem Kontrollverlust, dem totalen Ausgeliefertsein, die Angst vor dem "Nicht mehr Aufwachen", also die Todesangst, die Angst vor unbekannten Maschinen, vor Injektionen, Narkosemasken und vor möglichen Komplikationen (14,96,106).

Bei Kindern ist in der präoperativen Situation noch zusätzlich zu berücksichtigen, daß bei ihnen in der Regel die Einsicht in die Notwendigkeit des operativen Eingriffes fehlt und das Erleben dieser Situation in besonderer Weise emotional geprägt ist (6); insbesondere Kindern unter fünf Jahren fehlt der Realitätsbezug, ihre präoperative Angst resultiert größtenteils aus der Trennungsangst (56).

Die präoperative Angst hat nicht nur Bedeutung - im Sinne eines vorweggenommenen Leidens (14) - für die begrenzte Zeitspanne vor der Operation, sondern der Grad der präoperativen Angst hat auch Einfluß auf den Verlauf der Genesungsphase (54,80,102). Ohne angstsenkende Methoden sind folgende Auswirkungen zu erwarten: durch präoperative Schlafstörungen kommt es zu einem erheblichen ungünstigen Einfluß auf den Zustand des Patienten während der Operation; der Medikamentenbedarf gegen Schmerzen und Schlaflosigkeit prä- und postoperativ ist ebenso erhöht wie der Anästhetikabedarf bei Einleitung und Unterhaltung der Anästhesie (106,122); dies und die zugrundeliegenden physiologischen Veränderungen führen zu einer Erhöhung des Narkoserisikos (28); die Infektabwehr ist geschwächt, die Wundheilung beeinträchtigt und die postoperative Komplikationsrate bei abdominal operierten Patienten ist erhöht (8,23).

Postoperativ kann es außerdem zu negativen psychischen Reaktionen und zu Verhaltensstörungen kommen, insbesondere gegenüber dem Betreuungspersonal (14,19,54); auch hierdurch wird die postoperative Phase negativ beeinflusst.

Aus dem Ausgeführten ergibt sich die Notwendigkeit, die präoperative Angst so effektiv als möglich zu vermindern.

Eine Reihe von Studien beschäftigt sich mit der Erreichung dieses Zieles auf psychologischer Basis (1, 58,62,101); für den routinemäßigen Einsatz konnten jedoch bislang keine Methoden entwickelt werden, die zu einer ausreichenden Angstreduktion führen.

Neben der einfühlsamen und gründlichen präoperativen Anästhesievisite mit ihren positiven Wirkungen auf die Verarbeitung und Bewältigung präoperativer Angst (4,32,33,75,111,114,123) besteht somit weiterhin die Notwendigkeit für den Einsatz von Medikamenten zur Angstreduktion in der präoperativen Phase.

Bei der Anästhesievisite muß entschieden werden, ob neben dem Hauptziel Anxiolyse für den Patienten noch andere Prämedikationswirkungen erwünscht sind. Dies können sein: Sedierung, Analgesie, Salivationshemmung, d.h. Vagolyse. Zum Erreichen dieser Wirkungen stehen in der Pharmakologie eine Reihe von Medikamenten zur Verfügung.

Um eine anxiolytische Wirkung zu erzielen, sind Benzodiazepine als die Mittel der Wahl anzusehen (60,107). Sedierend wirken Barbiturate, Neuroleptika und Butyrophenonderivate, analgesierend die Opiate. Ist eine Hemmung der Salivation angezeigt, kommen Vagolytika zur Anwendung.

Im Einzelfall ist bei der Prämedikationsvisite, auch im Hinblick auf die individuellen Mechanismen der Angstbewältigung zu entscheiden, welche Medikamente der Patient präoperativ benötigt (51,117).

2.2. Messung der Angst

Zur Erfassung des emotionalen Reaktionssyndroms Angst ist eine gleichzeitige komplexe Betrachtung der Angstaspekte in den verschiedenen Reaktionsebenen und in ihrer zeitlichen Entwicklung und Situationsgebundenheit erforderlich (89,95).

Dies bedeutet, daß eine Methode, welche Selbstbeurteilung, Fremdbeurteilung und objektive Messungen kombiniert, aus derzeitiger Sicht die beste Erfassung der Angst erbringen dürfte (86,89).

Bei der Selbstbeurteilung hat der Patient die Fragebögen selbst auszufüllen, bei der Fremdbeurteilungsmethode nimmt der den Probanden beobachtende Untersucher die Dokumentation vor.

Zu einer umfassenden Meßmethode gehört es festzustellen, welche Grundängstlichkeit ("trait"-Angst) vorhanden ist, welche Angstsabwehrmechanismen (Repression, Normalität, Sensitization) vorliegen, wie der Verlauf der objektiv meßbaren Parameter (Herzfrequenz, Blutdruck) ist, wie der Zustand des Probanden bei Fremdbeurteilung ist und insbesondere, wie der Proband selbst in den jeweiligen Situationen seine momentane Angst ("state"-Angst) angibt.

Wird die Erfassung der Angst zum Vergleich der Angstreduktion von Medikamenten unter Klinikbedingungen vorgenommen, so ist hinsichtlich der Fremdbeurteilung zu bedenken, daß Sedierung nicht immer mit Anxiolyse gleichgesetzt werden kann; oft besteht eine Diskrepanz zwischen der Beurteilung der Medikationswirkung, die ein Beobachter feststellt und der Wirkung, wie sie der Proband empfindet (21,32,40). Bei der präopera-

tiven Medikation werden zum Teil Medikamente eingesetzt, welche den Patienten zwar sedieren - der Patient erscheint müde und ruhig - , aber keine Anxiolyse bewirken und unter Umständen sogar zusätzliche Angst hervorrufen (9,37,38,74,115,117).

Hinsichtlich der objektiv messbaren physiologischen Veränderungen ist zu berücksichtigen, daß es trotz der Vielzahl der Parameter (siehe Gliederungspunkt 2.1.1.) keinen angstspezifischen Parameter gibt. Die Parameter weisen untereinander nur geringe Interkorrelationen auf, d.h. sie unterliegen großen individuellen Schwankungen (72). Ihre Aussagekraft verringert zudem die Tatsache, daß auch andere Emotionen wie Schmerz, Wut und Ärger Auslöser entsprechender physiologischer Veränderungen sein können. Die z.T. geringen Halbwertszeiten der humoralen Parameter (z.B. Adrenalin) erschweren zusätzlich eine korrekte Messung. Das zuletzt Ausgeführte zeigt die enorme Problematik der Interpretation der physiologischen Reaktionen auf, da gerade diese objektiv messbaren Kriterien unter Klinikbedingungen einer Vielzahl unkontrollierbarer Einflüsse unterliegen.

Fragebögen zur Selbsteinschätzung sind somit bei der Messung der Wirkung der präoperativen Medikation und ihrer anxiolytischen Komponente derzeit die geeignetsten Angstindikatoren, da sie auf der Aussage der betroffenen Person über das persönliche, subjektive Erlebnis der Angst beruhen (45); sie sollten daher bei der Angstmessung den größten Raum einnehmen. In diesem Zusammenhang ist jedoch der Unterschied zwischen dem tatsächlich erlebten und dem über Fragebögen berichteten Angstzustand zu beachten. Die beiden Zu-

stände sind nicht immer deckungsgleich; dies bewirken die bereits erwähnten Angstabwehrmechanismen. Für die Interpretation von Selbstbeurteilungsdaten ist die Kenntnis dieser intrapsychischen Prozesse erforderlich.

In der vorliegenden Studie werden Meßmethoden angewandt, die auf Grund ihrer Erprobung unter Klinikbedingungen geeignet erscheinen, die aufgezeigten Anforderungen zu erfüllen.

2.2.1. Angstfragebogen situativ

Mit diesem Fragebogen (Abb. 3) wird der Grad der Ausgeglichenheit der Patienten gemessen; ein hoher Grad an Ausgeglichenheit wird als Angstfreiheit, ein niedriger als Angst gewertet. Dem Meßverfahren liegen Arbeiten von Nisbet und Norris zugrunde (83,84,85,86); die Auswertung in dieser Studie erfolgt in Anlehnung an Eser (37).

Score 1

Als objektive Kriterien werden Herzfrequenz und Blutdruck der Patienten zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen. Die erste Messung erfolgt am Tag vor der Operation während der Anästhesievisite. Die weiteren Meßzeitpunkte werden so gewählt, daß nach der Gabe der Prämedikation potentiell angstauslösende Momente erfasst werden: nach Umlagern auf den Operationstisch und nach Legen der Infusion (siehe Abb. 1). Ein Anstieg von Herzfrequenz und Blutdruck wird als physiologische Reaktion auf die angststimulierende Situation - in diesem Fall die bevorstehende Operation - gewertet.

In dieser Studie wird ein Anstieg der Herzfrequenz um 10 Schläge pro Minute und des systolischen und des diastolischen Druckes um 10 mmHg mit jeweils 2 Punkten bewertet. Keine Änderung der Parameter ergibt jeweils 1 Punkt und ein Abfall um 10 Schläge pro Minute bzw. 10 mmHg wird mit 0 Punkten bewertet. Die Addierung der Punkte ergibt Score 1; dieser ist somit Ausdruck der objektiv messbaren Kriterien der Ausgeglichenheit des Probanden. Je höher der Score, desto geringer ist die Ausgeglichenheit bzw. desto höher ist die Angst;

Score 1 kann maximal den Wert 12 erreichen.

Score 2

Desweiteren wird der Zustand des Probanden beurteilt (Fremdbeurteilung). Der Proband wird von dem Beobachter entweder als "ängstlich", "voll wach" oder "schläfrig (entspannt)" eingestuft.

Veränderungen der Zustandsstufe in Richtung "ängstlich" werden mit 2 Punkten, das Gleichbleiben der Zustandsstufe mit 1 Punkt und Veränderungen in Richtung "schläfrig (entspannt)" mit 0 Punkten bewertet.

Score 2 ergibt sich aus der Summierung von Score 1 und den Punkten für die Zustandsänderung. Dieser Score ist somit zu 14% Ausdruck der subjektiv empfundenen Ausgeglichenheit und zu 86% Ausdruck der objektiv gemessenen Ausgeglichenheit. Score 2 kann maximal den Wert 14 erreichen.

Score 3

Die Zustandsstufe "ängstlich" wird mit 2 Punkten, "voll wach" mit 1 Punkt und "schläfrig (entspannt)" mit 0 Punkten bewertet. Score 3 ergibt sich aus der Summierung von Score 2 und der Summe der Punkte für den Zustand zu den beiden Zeitpunkten. Dieser Score ist somit zu 22% Ausdruck des subjektiv empfundenen Zustandes des Patienten, zu 11% Ausdruck der subjektiv empfundenen Ausgeglichenheit und zu 67% Ausdruck der objektiv gemessenen Ausgeglichenheit. Score 3 kann maximal den Wert 18 erreichen.

2.2.2. R e p r e s s i o n s - S e n s i t i z a t i o n s - S k a l a

Bei der Beurteilung von Daten, welche durch Selbstbeurteilung der Patienten ermittelt werden, müssen individuelle Angstabwehrmechanismen berücksichtigt werden. Zur Erfassung dieser Angstabwehrmechanismen wurde ein eindimensionales bipolares Persönlichkeitskonzept der Angstabwehr entwickelt (15,16,65). An den beiden Polen werden Personen lokalisiert, welche zu einer inadäquaten Form der Angstabwehr neigen. Personen mit einer adäquaten Angstabwehr finden sich im Mittelbereich.

Der Unterschied zwischen den Personen an den beiden Polen besteht darin, daß die einen möglicherweise gefahrenrelevante Situationen als ausschließlich gefährlich interpretieren und entsprechend reagieren und die anderen solche Situationen in der Regel als gefahrlos betrachten und ein entsprechendes Verhalten zeigen.

Erstere werden als "Sensitizer" (Intellectualisierer), letztere als "Represser" (Verdränger) bezeichnet (65). Personen mit adäquater Angstabwehr werden als "Normale" bezeichnet.

Die Einteilung erfolgt mittels der Repressions-Sensitizations-Skala. Diese bestand in der ursprünglichen Form aus 127 Items (15); die deutsche Version, die in der vorliegenden Arbeit zur Anwendung kommt (Abb. 4), besteht aus 106 Items. Die aufgeführten Feststellungen sollen unter der Fragestellung, ob sie für gewöhnlich auf den Probanden zutreffen oder nicht, mit "richtig" (R) oder "falsch" (F) beantwortet werden.

Der in der Auswertung ermittelte Score kann 0 bis 106 betragen.

Personen mit adäquater Angstabwehr ("Normale") erreichen Scorewerte zwischen 26 und 48.

Represser erreichen Scorewerte von 0 bis 25.

Sensitizer erreichen Scorewerte von 49 bis 106.

2.2.3. STAI - G - X 2

Die im allgemeinen vorhandene Angst als Grundeigenschaft ("trait"-Angst) wird durch eine Selbstbeurteilungsskala gemessen, welche von Spielberger entwickelt wurde (71) und STAI-G-X2 (Abb. 5) benannt ist.

Sieben angstnegative und dreizehn angstpositive Items werden von den Probanden mit einer von vier Möglichkeiten - "fast nie", "manchmal", "oft", "fast immer" - beantwortet; die Instruktion zielt darauf ab, wie man sich im allgemeinen fühlt.

Durch die Auswertung ergibt sich ein Score zwischen 20 und 80; höhere Scorewerte bedeuten eine höhere Grundängstlichkeit. Als niedrigängstlich gelten Probanden mit Scorewerten bis 35, als hochängstlich Probanden mit Scorewerten ab 36.

Man erwartet von hochängstlichen Personen, daß sie auf gefahrenrelevante Situationen mit einem höheren Angstanstieg reagieren als niedrigängstliche (46). Die Grundangst selbst ist jedoch ereignisunabhängig und wird somit nicht von dem Meßzeitpunkt beeinflusst. Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit) des Testes sind gegeben (66).

2.2.4. Erlanger Angstskala - Situativ

Die Erlanger Angstskala - Situativ dient zur Messung der situativen, momentanen Angst. Sie steht unter der Instruktion, den Zustand im Augenblick zu beschreiben (Abb. 6).

Durch die Beantwortung der 24 zumeist angstpositiven Items durch den Probanden anhand einer vierstufigen Ratingskala - "sehr", "ziemlich", "ein wenig", "gar nicht" - ergibt sich ein Score von 24 bis 96; höhere Scorewerte bedeuten eine größere aktuelle Angst.

Angstpositive Items wie "bedrückt" oder "verkrampft" werden vorwiegend verwendet, da angstnegative Items wie "gut gelaunt" oder "zuversichtlich" nicht selten bei den Patienten in der präoperativen Phase auf Unverständnis stoßen (45).

Ihre Entwicklung und Testung unter Klinikverhältnissen prädestiniert die Erlanger Angstskala - Situativ für den Einsatz im Krankenhausbereich (45).

Auf Grund der hohen inneren Konsistenz des Testes und der hohen Zuverlässigkeitskoeffizienten für ein klinisches Kollektiv (45) erscheint die Erlanger Angstskala - Situativ gut geeignet zu sein, situationsbedingte, transitorische Angstzustände, wie sie in präoperativen Belastungssituationen auftreten können, quantitativ zu messen. Die Messung in dieser Studie zu verschiedenen Zeitpunkten - 1. am Tag vor der Operation / 2. auf dem Operationstisch unter der Wirkung der Prämedikation (siehe Abb. 1) - erlaubt es, die Entwicklung der Angst und ihre Beeinflussung durch Pharmaka zu erfassen.

Reliabilität und Validität des Testes sind gegeben (45).

2.2.5. Angst - Visuelle Analogskala

Mit diesem Fragebogen (Abb. 7) wird, wie mit der Erlanger Angstskala - Situativ, die momentane Angst durch Selbstbeurteilung gemessen. Auch mit solchen Analogskalen ist die Messung von Emotionen möglich (7,118).

Der Proband drückt sein Befinden aus, indem er eine, seinem Zustand entsprechende Stelle auf einer Linie zwischen zwei extremen, gegensätzlichen Aussagen markiert:

"schrecklich ängstlich" - "unerschütterlich gelassen";

"schrecklich niedergeschlagen" - "sehr hoffnungsvoll";

"furchtbar schwach" - "ausgesprochen stark";

"todmüde" - "hellwach".

Es werden also neben der Angst noch weitere Merkmale des Befindens gemessen.

Die Entfernung der markierten Stelle wird von dem jeweils positiven Item ("gelassen" - "hoffnungsvoll" - "stark" - "wach") aus in Millimetern bestimmt.

Der Abstand zwischen den zwei gegensätzlichen Items beträgt auf dem Originalfragebogen 100 Millimeter; Werte unter 50 liegen somit der positiven Aussage, Werte über 50 der negativen Aussage näher.

Auf Grund der gewählten Meßzeitpunkte - 1. am Tag vor der Operation / 2. auf dem Operationstisch unter der Wirkung der Prämedikation (siehe Abb. 1) - wird der Verlauf des Befindens und dessen Beeinflussung durch Pharmaka erfasst.

Nach Tolksdorf (118) ist die Validität des Testes gegeben.

3. Versuchsdurchführung

3.1. Pilotstudie

Vor der eigentlichen Studie wurde eine Pilotstudie durchgeführt, um organisatorische Fragen auf den Stationen und im Operationssaal abzuklären und um den Untersuchungsablauf einzuüben.

Es wurden zwei Dosierungen von Lormetazepam verwendet: 10 Patienten erhielten 1 mg Lormetazepam sublingual/buccal (= 1 Oblate) und 10 Patienten 2 mg Lormetazepam sublingual/buccal (= 2 Oblaten). Auf Grund der in der Pilotstudie beobachteten Medikationswirkungen - die Patienten erschienen entspannter und ruhiger als mit 1 mg Lormetazepam - entschied sich die Anästhesistin dafür, in der Studie 2 mg Lormetazepam zu verwenden.

Die gängige Prämedikation in der Anästhesieabteilung waren 50 mg Promethazin und 50 mg Pethidin; dieser entsprach nach dem subjektiven Empfinden der Anästhesistin in Bezug auf Entspannung, Angstverminderung und Ruhe die Wirkung von 2 mg Lormetazepam.

Die Patienten hatten keine Probleme, 2 Oblaten sublingual oder buccal - dies wurde den Patienten erklärt und freigestellt - im Mund zu behalten.

3.2. M e d i k a m e n t e


3.2.1. P r o m e t h a z i n (Atosil^R)

Promethazin ist ein Neuroleptikum aus der Gruppe der Phenothiazine. Chemisch ist es einigen anderen Neuroleptika z.B. dem Chlorpromazin nahe verwandt (41).

Chemie

Promethazin = N,N,α-trimethyl-10H-phenothiazin-10-ethanamin

Strukturformel:



Summenformel: C₁₇H₂₀N₂S

Molekulargewicht: 284,4

Pharmakokinetik

Promethazin wird bei oraler und intramuskulärer Applikation gut resorbiert. Zur Prämedikation wird es im allgemeinen intramuskulär verabreicht, um das Gebot der Nüchternheit nicht zu durchbrechen. Im Blut wird es - im Vergleich zu anderen Phenothiazinen - zu einem relativ geringen Teil an Plasmaproteine gebunden transportiert (42). Die Plasmahalbwertszeit beträgt drei bis vier Stunden. Die vollständige Wirkung tritt bei intramuskulärer Gabe nach 45 bis 60 Minuten ein (98).

Die Biotransformation erfolgt in der Leber durch Desalkylierung sowie durch Oxidation des Schwefel- und Stickstoffatoms im Ring und in der Seitenkette (119).

Ausgeschieden wird Promethazin - hauptsächlich in konjugierter Form - vorwiegend über die Nieren, zu einem kleinen Teil auch mit der Galle und den Faeces (119).

Pharmakologie

Promethazin wirkt antiallergisch durch eine kompetitive Hemmung von Histamin am Rezeptor (H_1 -Rezeptorenblocker)(41).

In der Prämedikation wird Promethazin auf Grund seiner zentraldämpfenden und sedierenden Eigenschaften eingesetzt. Die sedierende Wirkung kommt durch die Erhöhung der Reizschwelle in der Formatio reticularis für afferente Bahnen zustande; die Formatio reticularis wird so gegen äußere Reize abgeschirmt.

Promethazin bewirkt eine allgemeine vegetative Dämpfung; es wirkt sympathikolytisch und in besonderem Maß vagolytisch.

Durch seinen antiemetischen Effekt beugt es dem postoperativen Erbrechen vor (5).

Promethazin potenziert die Wirkung von Narkotika, Analgetika und Alkohol. Das Atemzentrum wird nicht beeinflusst (98).

Dosierung

Die Dosierung beträgt 1 mg/kg Körpergewicht; in der Regel wird die Prämedikation 45 Minuten präoperativ intramuskulär verabreicht.

Bei Überdosierung können Verwirrtheits- und Erregungszustände und generalisierte Krampfanfälle auftreten, da die Krampfschwelle im zentralen Nervensystem gesenkt wird (41).


3.2.2. Pethidin (Dolantin^R)

Pethidin ist ein Analgetikum, ein synthetischer Morphinagonist, der 10% der Morphinwirkung besitzt (120).

Chemie

Pethidin = 1-Methyl-4-phenyl-piperidin-4-carbonsäure-
-äthylester

Strukturformel:



Summenformel: $C_{15}H_{21}O_2N$

Molekulargewicht: 247,4

Pharmakokinetik

Pethidin wird bei oraler und intramuskulärer Applikation gut resorbiert. Zur Prämedikation wird es im allgemeinen intramuskulär verabreicht, um das Gebot der Nüchternheit nicht zu durchbrechen.

Im Blut werden 40% des Pethidin an Plasmaproteine gebunden transportiert. Die Plasmahalbwertszeit beträgt drei bis vier Stunden. Bei intramuskulärer Applikation tritt die analgetische Wirkung in der Regel nach 15 Minuten ein.

Die Biotransformation erfolgt in der Leber; es entsteht Pethidinsäure durch Hydroxilierung der Estergruppe oder Norpethidinsäure durch N-Demethylierung.

Die Ausscheidung erfolgt in konjugierter Form über die Nieren; nur sehr geringe Mengen werden unverändert im Urin ausgeschieden (41,120).

Pharmakologie

Die Wirkungen von Pethidin auf das zentrale Nervensystem sind in äquipotenter Dosierung denen des Morphins vergleichbar: Analgesie, Sedierung, Atemdepression, Suchtgefahr (41).

In der Prämedikation wird Pethidin auf Grund seiner analgetischen und sedierenden Eigenschaften eingesetzt (29).

Pethidin kann - vor allem bei Kindern - Erregungszustände hervorrufen; bei Epileptikern besteht die Gefahr von Krämpfen. Im Gegensatz zum Morphin verursacht es keine Miosis und wirkt nicht antitussiv. Pethidin unterdrückt das Kältezittern (41).

Peripher wirkt es tonisierend auf die glatte Muskulatur des Magen-Darm-Traktes und spasmolytisch auf die Bronchialmuskulatur. Die konstipierende Wirkung ist schwächer als die des Morphins. Der Tonus der glatten Muskulatur der Gefäße wird vermindert; deswegen kann es bei intravenöser Applikation zu einem orthostatischen Kollaps kommen (41).

Pethidin reduziert im Gegensatz zum Morphin die Pumpleistung und Kontraktilität des Herzens. Es kommt zu einer Zunahme des Drucks im rechten Vorhof und des enddiastolischen Drucks im linken Vorhof (112).

Pethidin setzt Histamin frei.

Dosierung

Die Dosierung beträgt 1 mg/kg Körpergewicht; in der Regel wird die Prämedikation 45 Minuten präoperativ intramuskulär verabreicht.

Bei Überdosierung kann es durch die Norpethidinsäure (Plasmahalbwertszeit 15 Stunden) zu Erregungszuständen und einem Mischbild aus Exzitation mit Zittern und Krämpfen und einer tiefen Sedierung bis zum Koma mit verlangsamter Atmung kommen (120).


3.2.3. Lormetazepam (Noctamid^R)

Bei Lormetazepam handelt es sich um ein neueres Benzodiazepin, das anfangs hauptsächlich als Schlafmittel Verwendung fand.

Chemie

Lormetazepam = 7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-3-hydroxy-1-methyl-2,3-dihydro-1 H-1,4-benzodiazepin-2-on

Strukturformel:



Summenformel: C₁₆H₁₂Cl₂N₂O₂

Molekulargewicht: 335,2

Pharmakokinetik

Lormetazepam kann intravenös, intramuskulär, oral und sublingual appliziert werden. Nach oraler Gabe wird es vollständig resorbiert und erreicht nach ca. 30 Minuten einen Plasmaspiegel von 80%. Nach sublingualer Gabe finden sich im Vergleich mit der oralen Medikation kaum Unterschiede hinsichtlich der Absorption und dem Anstieg im Plasma (78). Die höchsten Plasmaspiegel werden nach zwei Stunden erreicht (52). Es wird zu etwa 85% an Plasmaproteine gebunden transportiert.

Nach intravenöser Gabe erfolgt die Umverteilung in drei Phasen: Mit $t_{1/2} = 5$ Minuten befindet sich Lormetazepam im Blut und Extracellularraum, mit $t_{1/2} = 2,5$ Stunden erfolgt die Umverteilung in die Gewebe und mit $t_{1/2} = 11$ Stunden die Rückverteilung und Ausscheidung (53).

Die Inaktivierung von Lormetazepam findet sehr rasch in der Leber statt; 20% der Dosis unterliegen bereits einem "first pass"-Effekt. Es wird mit Glucuronsäure konjugiert. Die Halbwertszeit für Lormetazepam-Glukoronid beträgt dreizehn Stunden. Die Ausscheidung des Glukoronid erfolgt fast ausschließlich über die Nieren. Wie alle Benzodiazepine, die durch Glukuronidierung eliminiert werden, ist auch Lormetazepam in seiner Pharmakokinetik weitgehend altersunabhängig (64).

Durch N-Demethylierung entsteht in weniger als 6% als einziger aktiver Metabolit Lorazepam, das dem entero-hepatischen Kreislauf unterliegt. Lorazepam wird ebenfalls renal ausgeschieden (52).

Pharmakologie

Lormetazepam besitzt antikonvulsive und muskelrelaxierende Eigenschaften (93). Es wirkt anxiolytisch, sedativ, amnestisch und hypnotisch (26,68,87,91).

Sowohl bei parenteraler als bei oraler Applikation kommt es zunächst zu tranquilierenden, mit steigender Dosierung zu sedativen und zu hypnotischen Effekten (25,68). Erkennen lassen sich diese dosisabhängigen Wirkungen durch charakteristische Veränderungen im EEG, in dem sich eine Zunahme der β -Aktivität, Überlagert von β -Spindeln zeigt (69,87); die Einschlafdauer und die Aufwachhäufigkeit sinken, die Schlafdauer ist verlängert (25,90).

In der Prämedikation wird Lormetazepam wegen der anxiolytischen und sedativen Eigenschaften eingesetzt. Diese Wirkungen werden über Benzodiazepin-Rezeptoren im ZNS vermittelt (27). Diese stehen in enger funktioneller Verbindung mit den Gamma-Aminobuttersäure-(GABA)-Rezeptoren (82).

Dosierung

Die Dosierung als Schlafmittel beträgt 0,5 - 2,0 mg pro 70 kg Körpergewicht bei intravenöser Applikation.

Zur Prämedikation werden 1,0 - 2,0 mg pro 70 kg Körpergewicht oral verabreicht.

Insbesondere bei höheren Dosierungen (ab 2 mg/70 kg Körpergewicht) kann es zu Benommenheit, Kopfschmerzen und Schwindel kommen (48,59). Durch die kurze Halbwertszeit ergibt sich kaum ein Überhang am nächsten Morgen (48).

3.2.4. Akzeptanz der Applikations- form der Medikamente

Die Applikation der in dieser Studie zu vergleichenden Medikamente erfolgte für die Prämedikation auf unterschiedliche Weise; Promethazin/Pethidin wurde intramuskulär, Lormetazepam sublingual/buccal verabreicht.

Inwieweit die jeweilige Verabreichungsform von den Patienten bzw. dem Pflegepersonal akzeptiert wurde, ist eine der Fragestellungen dieser Studie. Die Akzeptanz wurde mit Hilfe von Fragebögen untersucht.

Unmittelbar nach der Prämedikation füllte der Proband einen Fragebogen (siehe Abb. 8) mit sechs Fragen über die Verabreichungsform der Medikation aus; dabei wurde eine der vier Beantwortungsmöglichkeiten angekreuzt (Auswertung siehe 4.7.). Zu diesem Zeitpunkt lag noch keine Wirkung der Medikation vor.

Zur gleichen Zeit füllte auch die Schwester, die die Prämedikation durchführte, einen Fragebogen (siehe Abb. 9) mit ebenfalls sechs Fragen über die Verabreichungsform der Medikation aus; auch dabei wurde eine der vier Beantwortungsmöglichkeiten angekreuzt (Auswertung siehe 4.7.).

3.3. Datenerhebung

3.3.1. Versuchsaufbau

Ort

Die Studie wurde an einem Kreiskrankenhaus auf fünf chirurgischen, einer gynäkologischen, einer orthopädischen und einer Station für Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen durchgeführt.

Design

Es handelte sich um eine kontrollierte klinische Studie mit Doppelblindcharakter (30). Die Verabreichung der Medikamente erfolgte nach einem Randomisierungsplan. Weder die Anästhesistin, noch die Schwester, die die Prämedikation durchführte, noch der Patient wussten welches Medikament der Patient erhielt.

Die Medikamente wurden nach dem Randomisierungsplan von einer zweiten Anästhesistin vorbereitet. Diese besaß auch den Verteilungsschlüssel für Notfälle. Sie beteiligte sich weder an der Durchführung noch an der Auswertung der Studie. Die Untersuchung wurde nur von einer Anästhesistin durchgeführt, um die Einflüsse des Untersuchers auf die Probanden konstant zu halten.

Vor der eigentlichen Studie wurde eine Pilotstudie (siehe 3.1.) durchgeführt, in der die Entscheidung über die Dosierung von Lormetazepam getroffen worden war. In der Studie selbst erhielten 40 Patienten Lormetazepam und 40 Patienten Promethazin/Pethidin.

Medikation

Alle Patienten erhielten am Vorabend 1 mg Lormetazepam per os als Abendmedikation.

40 Patienten erhielten am Operationstag 30 - 45 Minuten vor Operationsbeginn 2 mg Lormetazepam sublingual/buccal (2 Oblaten) und 3 ml physiologische Kochsalzlösung intramuskulär.

40 Patienten erhielten ebenfalls 30 - 45 Minuten vor Operationsbeginn 50 mg Promethazin und 50 mg Pethidin intramuskulär (zusammen 3 ml) und ein Placebo (2 Oblaten) sublingual/buccal.

Patientenauswahl

Die Vorauswahl erfolgte nach dem Zufallsprinzip, wie die Patienten für den nächsten Tag auf dem Operationsplan standen.

Es wurden nur Patienten mit einem Alter zwischen 18 und 60 Jahren an der Studie beteiligt. Es wurde angestrebt, gleich viele Männer und Frauen in die Studie aufzunehmen. Alle Patienten unterzogen sich Wahleingriffen und wiesen ein geringes Narkoserisiko (ASA I) auf. Nur ein Teilnehmer wurde mit ASA II eingestuft.

Es wurden nur Patienten in die Studie aufgenommen, für die eine Vollnarkose vorgesehen war und die mit dieser einverstanden waren.

Zur Beantwortung der Fragen sollten die Patienten die deutsche Sprache beherrschen und sich in ihr ausdrücken können.

Patienten, die eine Medikamentenanamnese aufwiesen - vor allem Sedativa - wurden nicht in die Studie aufgenommen, um Wechselwirkungen zu vermeiden. Ausnahmen: 3 Patientinnen nahmen Ovulationshemmer, 8 Patienten Schilddrüsenhormone, 1 Patient Allopurinol und 1 Patient Pindolol.

Patienten mit vermehrter Narkose- bzw. Operationserfahrung wurden ebenfalls nicht in die Studie aufgenommen.

3.3.2. Versuchsablauf (siehe Abb. 1)

Tag vor der Operation

Die Anästhesistin besuchte am Tag vor der Operation die Patienten, die anhand des Operationsplanes für die Studie in Frage kamen. Der Besuch verlief standardisiert; die Anästhesistin nahm die Erhebung der Anamnese, die Untersuchung der Patienten sowie die Aufklärung über die Narkose und die Studie auf immer die gleiche Art und Weise vor; ihr Verhalten dem Patienten gegenüber war immer gleich.

Zunächst wurde die Anamnese erhoben; der Patient wurde über Medikamente, Vorerkrankungen und frühere Narkosen befragt. Anschließend erfolgte die körperliche Untersuchung, Herzfrequenz und Blutdruck wurden gemessen und der Patient wurde über die Vollnarkose aufgeklärt. Ergaben sich keine Fragen mehr, unterschrieb der Patient für die Narkose.

Hatten sich keine Kontraindikationen für die Teilnahme an der Studie ergeben, wurden die Patienten davon unterrichtet, daß eine Studie über präoperative Angst durchgeführt werde. Der Ablauf wurde dargestellt, auf die Freiwilligkeit der Teilnahme hingewiesen und die Patienten um ihre Mitarbeit gebeten. Die mündliche Einwilligung wurde in Anwesenheit von Zeugen (Schwester, Mitpatienten) gegeben.

Waren die Patienten einverstanden, erhielten sie die Fragebögen Repressions-Sensitizations-Skala, STAI-G-X2, Angst - Visuelle Analogskala und Erlanger Angstskala - Situativ (siehe Abb. 4 - 7) ausgehändigt, um sie im Anschluß an das Gespräch auszufüllen.

Die Anästhesistin füllte den Anamnesebogen mit den

Daten der Patienten aus, trug Herzfrequenz und Blutdruck ein und bewertete, ob der Patient ängstlich, voll wach oder schläfrig (entspannt) erschien (siehe Abb. 2 und 3).

Am Abend erhielten die Patienten zum Einschlafen 1 mg Lormetazepam als Tablette.

Operationstag

Alle Operationen fanden am Vormittag statt.

Auf Station erhielten 40 Patienten 30 - 45 Minuten vor Operationsbeginn nach dem Randomisierungsplan 2 mg Lormetazepam (2 Oblaten) sublingual/buccal und 3 ml physiologische Kochsalzlösung intramuskulär.

40 Patienten erhielten 2 Placebo-Oblaten sublingual/buccal und 50 mg Promethazin (2 ml) und 50 mg Pethidin (1 ml) in einer Mischspritze intramuskulär.

Unmittelbar nach der Prämedikation füllten die Patienten den Fragebogen zur Akzeptanz der Medikation aus (siehe Abb. 8), den sie von der Schwester erhielten; die Schwester beantwortete ebenfalls ihren Fragebogen zur Akzeptanz (siehe Abb. 9).

Im Operationssaal wurden nach dem Umlagern auf den Operationstisch Herzfrequenz und Blutdruck gemessen und der Patient füllte noch einmal die Fragebögen Angst - Visuelle Analogskala und Erlanger Angstskala - Situativ aus. Die Anästhesistin beurteilte erneut, ob der Patient ängstlich, voll wach oder schläfrig (entspannt) war.

Nach dem Legen der Infusion wurden wiederum Herzfrequenz und Blutdruck gemessen.

Anschließend wurde die Narkose eingeleitet.

3.4. Statistische Auswertung

Die Auswertung der randomisierten Doppelblindstudie mit den zwei unabhängigen Medikationsgruppen erfordert den Einsatz verschiedener statistischer Methoden.

Mit der deskriptiven Statistik (Mittelwerte mit Standardabweichungen) wird das gegebene Zahlenmaterial dargestellt, um Informationen über die Ausgangssituation der einzelnen Variablen und ihrer Veränderung über die Zeit zu erhalten.

Um Unterschiede zwischen den beiden Behandlungsgruppen zu überprüfen, werden die Ergebnisse der Fragebögen getrennt nach der Medikation getestet. Es wird zweiseitig untersucht. Die Nullhypothese - Lormetazepam sublingual/buccal ist zur Prämedikation so gut geeignet wie Promethazin/Pethidin intramuskulär - wird mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von $\alpha = 5\%$ abgelehnt.

Der Vergleich der beiden unabhängigen Stichproben erfolgt mit dem U-Test nach Wilcoxon, Mann und Whitney bei der Erlanger Angstskala - Situativ und bei der Angst - Visuelle Analogskala sowie dem t-Test bei dem Angstfragebogen situativ.

Um für weitere Studien eine einfache Methode der Auswertung zur Verfügung zu haben, wird nachträglich, da die Zahl der Probanden bereits festgelegt war, mit der Sequentialanalyse gearbeitet (11,20). Diese ermöglicht es, schon während einer Studie statistisch gesicherte Aussagen zu erhalten und somit die Anzahl der Probanden auf die erforderliche Menge zu begrenzen.

4. E r g e b n i s s e

4.1. A n a m n e s e d a t e n

Für die Verteilung des Geschlechts ergibt sich, daß in der Gruppe der Lormetazepam - Patienten etwas mehr Männer, in der Gruppe der Promethazin/Pethidin - Patienten mehr Frauen sind (Tab. 1).

Hinsichtlich Alter, Gewicht und Größe sind die Lormetazepam- und die Promethazin/Pethidin - Patienten in den Mittelwerten und den Standardabweichungen nahezu ausgeglichen (Tab. 1). Auch bei der Aufteilung nach dem Geschlecht innerhalb der Medikationsgruppen ergeben sich für diese Parameter zwischen den Gruppen keine größeren Unterschiede (Tab. 2).

Die Verteilung der Altersgruppen in den Medikationsgruppen ist gleich (Tab. 3).

Die Narkoseerfahrung liegt in der Lormetazepam - Gruppe etwas höher als im Vergleichskollektiv. In beiden Gruppen haben die Frauen bisher mehr Narkosen erlebt als die Männer (Tab. 1 und 2).

Bei der Operationsdauer finden sich zwischen den beiden Gruppen in Mittelwert und Standardabweichung keine großen Unterschiede (Tab. 1).

4.2. Angstfragebogen situativ

Die Messungen von Herzfrequenz und Blutdruck zu den verschiedenen Meßzeitpunkten (Abb. 1) ergeben annähernd gleiche Mittelwerte für die Lormetazepam- und Promethazin/Pethidin - Patienten (Abb. 10). In beiden Gruppen kommt es zu einer deutlichen Steigerung der Herzfrequenz und zu einer leichten Erhöhung des systolischen und diastolischen Blutdrucks (Abb. 11). Die Erhöhung der Herzfrequenz innerhalb beider Gruppen ist signifikant (t-Test). Dagegen ergeben sich keine signifikanten Unterschiede innerhalb beider Gruppen beim Anstieg des Blutdrucks (t-Test). Zwischen den beiden Gruppen bestehen zu den verschiedenen Meßzeitpunkten keine signifikanten Unterschiede (U-Test).

Der Mittelwert des Score 1 ist für die Lormetazepam-Patienten niedriger als für die Promethazin/Pethidin-Patienten. Der Unterschied ist nicht signifikant. Score 1 ist Ausdruck der Änderung von Herzfrequenz und Blutdruck; je niedriger Score 1, desto geringer ist der Anstieg von Herzfrequenz und Blutdruck (siehe auch Gliederungspunkt 2.2.1. und Tab. 4).

Die Mittelwerte von Score 2 und Score 3 (Tab. 4) unterscheiden sich für die beiden Medikationsgruppen nicht. Score 2 und Score 3 sind Ausdruck der Änderung von Herzfrequenz und Blutdruck plus Fremdbeurteilung der Zustandsänderung (Score 2) plus Fremdbeurteilung des Zustandes des Patienten (Score 3) (siehe auch Gliederungspunkt 2.2.1.).

4.3. R e p r e s s i o n s - S e n s i t i z a t i o n s - S k a l a

Mittels der Repressions-Sensitizations-Skala werden die Patienten auf Grund ihrer individuellen Angstabwehrmechanismen in Represser, Normale und Sensitizer eingeteilt (siehe auch Gliederungspunkt 2.2.2.).

Die Patienten, welche als Represser und Normale ermittelt werden, sind in beiden Gruppen gleichverteilt; in der Gruppe der Lormetazepam - Patienten befinden sich dagegen etwas mehr Sensitizer (Tab. 5). Es wird in der Diskussion zu berücksichtigen sein, ob dieser geringe Unterschied von Bedeutung ist.

Bei der Unterteilung nach dem Geschlecht (Tab. 6) ergibt sich eine prozentuale Gleichverteilung der Probanden bei den Repressern; vermehrt weibliche Probanden finden sich bei den Normalen und vermehrt männliche bei den Sensitizern.

Bei beiden Geschlechtern findet sich etwa die Hälfte der Patienten in der Gruppe der Represser (Tab. 6).

4.4. S T A I - G - X 2

Mit diesem Test wird die allgemeine Grundangst, die "trait"-Angst der Patienten gemessen (siehe auch Gliederungspunkt 2.2.3.).

Die Mittelwerte der Scores beider Gruppen liegen im Bereich für Hochängstliche (Score > 35).

In der Gruppe der Lormetazepam - Patienten befinden sich mehr Hoch- und weniger Niedrigängstliche als in der Gruppe der Promethazin/Pethidin - Patienten. Der Score der Lormetazepam - Patienten liegt ebenfalls höher (Tab. 7 und 8).

In beiden Gruppen unterscheiden sich Frauen und Männer im Gesamtscore kaum voneinander (Tab. 7). Allerdings finden sich anteilmäßig mehr Frauen in der Gruppe der Niedrigängstlichen (Tab. 9).

4.5. Erlanger Angstskala - Situativ

Mit diesem Fragebogen erfolgt die Meßung der situativen Angst zu zwei Meßzeitpunkten (siehe auch Gliederungspunkt 2.2.4. und Abb. 12).

Die Mittelwerte zwischen den beiden Medikationsgruppen unterscheiden sich am Tag vor der Operation zum Meßzeitpunkt 1 nicht (Tab. 10). Sowohl in der Gruppe der Lormetazepam - Patienten, als auch in der Gruppe der Promethazin/Pethidin - Patienten haben die Frauen eine höhere Punktzahl als die Männer (Tab. 11).

Unmittelbar präoperativ zum Meßzeitpunkt 2 kommt es in beiden Gruppen zu einem Anstieg der situativen Angst (Tab. 10). Dabei ergibt sich kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen (U-Test). Der Anstieg innerhalb der Gruppe ist jedoch signifikant (Wilcoxon-Test). Beim Vergleich der Geschlechter nimmt die situative Angst bei den Männern etwas mehr zu. Die Frauen haben aber in beiden Gruppen einen höheren Score (Tab. 11).

Bei der Unterteilung in Hoch- und Niedrigängstliche findet sich in beiden Gruppen ein deutlicher höherer Score zum Meßzeitpunkt 1 für die Hochängstlichen (Tab. 12). Die situative Angst der Niedrigängstlichen steigt in beiden Medikationsgruppen zum Meßzeitpunkt 2 signifikant an (Wilcoxon-Test); der Score der Hochängstlichen liegt ebenfalls höher als zum ersten Meßzeitpunkt, bei den Lormetazepam - Patienten läßt sich, im Gegensatz zu den Promethazin/Pethidin - Patienten, dieser Anstieg statistisch absichern (Tab. 12). Die beiden Gruppen unterscheiden sich jedoch untereinander nicht im Verlauf der situativen Angst.

Beim Vergleich der beiden Medikationsgruppen nach den Ergebnissen der Repressions-Sensitizations-Skala finden sich in der Lormetazepam-Gruppe ansteigende Scorewerte zum Meßzeitpunkt 1 für Repressoren, Normale und Sensitizer. In der Promethazin/Pethidin-Gruppe haben die Repressoren ebenfalls die niedrigsten Werte, die Normalen aber einen etwas höheren Score als die Sensitizer (Tab. 12).

Am Meßzeitpunkt 2 steigt in beiden Gruppen der Score der situativen Angst an. Die höchsten Werte erreichen die Normalen. Die Repressoren steigen in beiden Gruppen mit dem Score ebenfalls stärker an ($p < 0,05$), während die Sensitizer kaum einen Anstieg der situativen Angst zeigen (Lormetazepam - Patienten) bzw. bei den Promethazin/Pethidin - Patienten einen etwas geringeren Score aufweisen (Tab. 12).

Ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Medikationsgruppen findet sich auch hier nicht.

4.6. Angst - Visuelle Analogskala

Durch die Messungen mit diesem Fragebogen - am Tag vor der Operation und auf dem Operationstisch unter Medikation, unmittelbar präoperativ - ist es möglich, die Entwicklung des Befindens der Patienten bzw. deren Beeinflussung durch die Medikation zu erfassen (Konzeption und Auswertung des Fragebogens siehe Gliederungspunkt 2.2.5.).

Für die Patienten, welche Lormetazepam als Prämedikation erhielten, ergeben sich folgende Ergebnisse (Tab. 13): Unter der Medikation (auf dem Operationstisch) schätzen sich diese Patienten als weniger ängstlich ein als am Tag vor der Operation; die Angst wird signifikant vermindert (Wilcoxon-Test).

Sie beurteilen sich als weniger niedergeschlagen; dieses Ergebnis läßt sich statistisch nicht absichern. Für die Selbsteinschätzung zwischen schwach und stark ergibt sich zu den zwei Meßzeitpunkten kein Unterschied. Präoperativ fühlen sich die Patienten etwas müder als am Tag vor der Operation; der Unterschied ist nicht signifikant.

Für die Patienten, welche Promethazin/Pethidin als Prämedikation erhielten, ergeben sich folgende Ergebnisse (Tab. 13): Unter der Medikation (auf dem Operationstisch) schätzen sich diese Patienten ängstlicher ein als am Tag vor der Operation; der Unterschied läßt sich statistisch nicht absichern.

Sie beurteilen sich unter der Medikation als niedergeschlagener; der Unterschied ist nicht signifikant.

Die Probanden fühlen sich präoperativ deutlich schwächer als am Vortag; für dieses Ergebnis ist eine Signifikanz gegeben (Wilcoxon-Test).

Auch empfinden sie sich als deutlich müder als am Tag vor der Operation; dieser Unterschied ist ebenfalls signifikant (Wilcoxon-Test).

Beim Vergleich der beiden Medikationsgruppen gegeneinander (Tab. 14, Abb. 13), steht einer Zunahme der Angst und der Niedergeschlagenheit in der Promethazin/Pethidin - Gruppe eine Abnahme dieser beiden Empfindungen in der Lormetazepam - Gruppe gegenüber; der Unterschied erweist sich jedoch im U-Test nicht als signifikant. Die Auswertung mit der Sequentialanalyse führt aber bei der Abnahme der Angst nach der Auswertung der Ergebnisse von 80 Patienten und bei der Abnahme der Niedergeschlagenheit schon nach 26 Patienten zu einem signifikant besseren Ergebnis des Lormetazepams (Abb. 16 und 17).

Die Gefühle der Schwäche und der Müdigkeit nehmen in der Promethazin/Pethidin - Gruppe unmittelbar präoperativ deutlich zu. In der Lormetazepam - Gruppe hingegen steigern sich Schwächegefühl und Müdigkeit gegenüber dem Vortag nur gering. Die Anstiege der Promethazin/Pethidin - Gruppe sind für beide Items signifikant (U-Test). Auch bei der Auswertung mit der Sequentialanalyse führt das Begriffspaar "stark - schwach" nach der Bewertung von 80 Patienten und das Paar "hellwach - todmüde" nach der Bewertung von 58 Patienten zu einem signifikant besseren Ergebnis zugunsten von Lormetazepam (Abb. 18 und 19).

Bei der Aufteilung der Ergebnisse in Hoch- und Niedrigängstliche nach dem STAI-G-X2 weisen die Niedrigängstlichen durchwegs geringere Werte auf als die Hochängstlichen. Auch hier finden sich die Ergebnisse, die schon beim Gesamtkollektiv aufgezeigt wurden: bei den Patienten aus der Lormetazepam - Gruppe zeigt

sich eine Abnahme der Angst und der Niedergeschlagenheit - bei den Niedrigängstlichen ist die Reduktion der Angst signifikant (Wilcoxon-Test) - während die Promethazin/Pethidin - Patienten ängstlicher und niedergeschlagener werden (Tab. 15 und 16).

Die Patienten der Promethazin/Pethidin - Gruppe empfinden sich auch als deutlich schwächer und müder - sowohl die Hoch- als auch die Niedrigängstlichen weisen bei diesen beiden Items einen signifikanten Zuwachs auf - während sich keine größeren Änderungen für die Lormetazepam - Patienten ergeben (Tab. 17 und 18).

In Tab. 15 bis Tab. 18 werden auch die Ergebnisse nach der Repressions-Sensitizations-Skala der Repressoren, Normalen und Sensitizer dargestellt.

Bei den Repressoren - also Personen, die kaum bereit sind sich zu ihren Empfindungen zu bekennen - geben die in der Lormetazepam - Gruppe befindlichen verglichen mit den Repressoren in der Promethazin/Pethidin - Gruppe eine positivere Entwicklung ihrer Empfindungen an.

Bei den Normalen steht einer Verbesserung bzw. einem unverändertem Zustand der Lormetazepam - Patienten eine deutliche negative Entwicklung der Promethazin/-Pethidin - Patienten gegenüber; für die Items "todmüde" und "schwach" läßt sich dieses Ergebnis auch statistisch absichern.

Die Sensitizer - also Personen, die dazu neigen, ihre Gefühle zu übersteigern - geben in der Lormetazepam - Gruppe eine Verbesserung, in der Promethazin/Pethidin - Gruppe zumeist eine Verschlechterung ihres Zustandes an; für das Begriffspaar "stark - schwach" ist der Unterschied signifikant.

4.7. Akzeptanz der Applikationsform der Medikamente

Mit zwei Fragebögen (Abb. 8 und Abb. 9) wurde die Akzeptanz der Applikationsformen (intramuskulär bzw. sublingual/buccal) untersucht (siehe Gliederungspunkt 3.2.4.).

Die Auswertung erfolgt auf folgende Weise: den vier Beantwortungsmöglichkeiten werden Punkte zugeordnet; der Antwort "gar nicht" 1 Punkt, der Antwort "ein wenig" 2 Punkte, der Antwort "ziemlich" 3 Punkte und der Antwort "sehr" 4 Punkte.

Die Auswertung der 80 Fragebögen ergibt folgende Ergebnisse:

Akzeptanzfragebogen Patient (Abb. 14)

Für die 1. Frage, ob es schwierig war, die Oblate lange im Mund zu behalten, ergibt sich ein Mittelwert von 1,35 bei einer Standardabweichung von 0,60; dies bedeutet, daß die Patienten in der großen Mehrzahl in dieser Hinsicht keine Probleme hatten.

Für die 2. Frage, ob es unangenehm war, eine Spritze zu bekommen, ergibt sich ein Mittelwert von 1,94 bei einer Standardabweichung von 0,93; der Durchschnitt empfand die Spritze also "ein wenig" unangenehm.

Für die 3. Frage, ob sich nach der Oblatenaufnahme Speichel gebildet hat, ergibt sich ein Mittelwert von 1,90 bei einer Standardabweichung von 0,72; auch dies war also "ein wenig" der Fall.

Für die 4. Frage, ob der Patient Schmerzen durch die Spritze hatte, ergibt sich ein Mittelwert von 1,70 bei einer Standardabweichung von 0,77; im Durchschnitt ergaben sich also "ein wenig" bis gar keine Schmerzen.

Für die 5. Frage, ob der Patient bei einer weiteren Operation lieber nur eine Oblate nehmen würde, ergibt sich ein Mittelwert von 2,78 bei einer Standardabweichung von 1,26; umgesetzt entspricht dies der Antwort "ziemlich" mit leichter Tendenz zu "ein wenig". Für die 6. Frage, ob sich der Patient bei einer weiteren Operation lieber nur spritzen lasse, ergibt sich ein Mittelwert von 1,90 bei einer Standardabweichung von 1,08; umgesetzt lautet hier die Antwort also "ein wenig" mit leichter Tendenz zu "gar nicht".

Abb. 14 zeigt die Zahl der Patienten, die sich bei der 5. bzw. 6. Frage für die jeweiligen Beantwortungsmöglichkeiten entschieden.

Beim Vergleich der Akzeptanz der Spritze (6. Frage) mit der Akzeptanz der Oblate (5. Frage) ergibt sich eine signifikant höhere Akzeptanz durch die Patienten zugunsten der Oblate (Wilcoxon-Test).

Akzeptanzfragebogen Schwester (Abb. 15)

Die Fragebögen wurden von 23 verschiedenen Schwestern und Pflegern ausgefüllt.

Für die 1. Frage, ob es mühsam war, die Oblate richtig zu verabreichen, ergibt sich in der Auswertung ein Mittelwert von 1,05 bei einer Standardabweichung von 0,22; hier ergibt sich somit die klare Antwort "gar nicht".

Für die 2. Frage, ob es mühsam war, die Spritze richtig zu verabreichen, ergibt sich ein Mittelwert von 1,34 bei einer Standardabweichung von 0,57; auch hier lautet die Antwort "gar nicht", allerdings mit Tendenz zu "ein wenig".

Für die 3. Frage, ob, nach Ansicht der Schwester, der Patient die Oblate akzeptierte, ergibt sich der Mittel-

wert 3,60 bei einer Standardabweichung von 0,77; umgesetzt bedeutet dies, daß der Patient, nach Ansicht der Schwester, die Oblate "sehr" bis "ziemlich" akzeptierte.

Für die 4. Frage, ob, nach Ansicht der Schwester, der Patient die Spritze akzeptierte, ergibt sich ein Mittelwert von 2,69 bei einer Standardabweichung von 0,98; hier lautet die Antwort also "ziemlich" bis "ein wenig".

Für die 5. Frage, ob die Schwester in Zukunft gerne eine Oblate verabreichen würde, ergibt sich ein Mittelwert von 3,93 bei einer Standardabweichung von 0,31; dies entspricht der klaren Antwort "sehr".

Für die 6. Frage, ob die Schwester in Zukunft gerne eine Spritze verabreichen würde, ergibt sich ein Mittelwert von 1,59 bei einer Standardabweichung von 1,31; für diese Frage also die Antwort "gar nicht" mit Tendenz zu "ein wenig".

Abb. 15 zeigt die Anzahl der Fragebögen, in denen sich das Pflegepersonal bei der 5. bzw. 6. Frage für die jeweiligen Beantwortungsmöglichkeiten entschied.

Beim Vergleich der Akzeptanz der Spritze (6. Frage) mit der Akzeptanz der Oblate (5. Frage) ergibt sich eine signifikant höhere Akzeptanz zugunsten der Oblate durch das Pflegepersonal (Wilcoxon-Test).

5. Diskussion

5.1. Ausgangssituation der beiden Medikationsgruppen

Anamnesedaten

Die erfassten Anamnesedaten zeigen eine weitgehende Übereinstimmung für beide Medikationsgruppen auf; es ergibt sich lediglich ein zufälliger, höherer Anteil von Frauen in der Promethazin/Pethidin - Gruppe. Ob hierdurch ein Einfluß ausgeübt wird, wird sich bei der Betrachtung der Angstabwehrmechanismen und der Grundängstlichkeit zeigen.

Insgesamt handelt es sich beim Vergleich der Anamnese-daten um ein sehr ausgeglichenes Patientenkollektiv, so daß von dieser Seite keine Beeinflussung der durchgeführten Messungen zu erwarten ist.

Angstabwehrmechanismen

Wie bei anderen Studien zeigt sich auch bei dieser, daß die Mehrzahl der Patienten der Gruppe der Repressoren zuzuordnen ist; die zweitgrößte Gruppe bilden die sogenannten Normalen, während die Sensitizer die weitaus kleinste Gruppierung ergeben (113, 116, 121).

Da sich in beiden Medikationsgruppen die überwiegende Zahl der Patienten bei den Repressoren und Normalen findet und dort annähernd gleich verteilt ist, dürfte hinsichtlich der Bereitschaft, die eigene Angst zu äußern, zwischen den beiden Medikationsgruppen kein Unterschied bestehen. Das Übergewicht der Sensitizer bei der Lormetazepam - Gruppe sollte wegen der geringen Anzahl in Bezug auf das Gesamtkollektiv keine große

Bedeutung haben.

Bei der Betrachtung der Angstabwehrmechanismen für Frauen und Männer zeigt sich, daß in der Gruppe der Normalen prozentual mehr Frauen und in der Gruppe der Sensitizer prozentual mehr Männer sind. Für die Bewertung der Angst-Meßergebnisse dieser Studie ist dies auf Grund der Gesamtsituation der Angstabwehrmechanismen ohne Einfluß.

Grundangst

Die bei diesem Patientenkollektiv gefundenen Werte für die Grundangst stehen in guter Übereinstimmung mit den in der Literatur angegebenen Werten (18,37, 121).

In dieser Studie weisen die Lormetazepam - Patienten eine höhere Grundangst als die Promethazin/Pethidin - Patienten auf. Damit kann erwartet werden, daß die Lormetazepam - Patienten mit einem höheren Anstieg der situativen Angst reagieren werden (46).

Ein Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Höhe der Grundangst ist auf Grund der Ergebnisse nicht erkennbar. In der Literatur finden sich für diesen Zusammenhang unterschiedliche Angaben (37,121).

5.2. Entwicklung der situativen Angst

Angstfragebogen situativ

Hinsichtlich Herzfrequenz und Blutdruck weisen die Promethazin/Pethidin - Patienten einen größeren Anstieg auf als die Lormetazepam - Patienten (Score 1). Bei der Hinzunahme der Fremdbeurteilung der Patienten ergeben sich ausgeglichene Score-Werte für beide Medikationsgruppen.

Eine Interpretation dieses Tests in der gegebenen Form erscheint jedoch nicht sinnvoll, da durch die vorgegebenen Kriterien der Fremdbeurteilungsskala eine Differenzierung zwischen diesen beiden Medikationsgruppen nicht möglich war. So wird das Kriterium "schläfrig" bzw. "entspannt" in der Skala als gleichbedeutend betrachtet. Dies stimmt nicht mit den in der präoperativen Phase gemachten Beobachtungen überein.

Die Heranziehung von Herzfrequenz und Blutdruck als objektiv und leicht messbare Angstparameter erscheint hilfreich, wobei in jedem Fall mit bedacht werden muß, daß es eine Vielzahl anderer Faktoren gibt, die diese Parameter beeinflussen (72). In diesem Zusammenhang muß bedacht werden, daß Lormetazepam Herzfrequenz und Blutdruck nur wenig beeinflusst (68). Pethidin dagegen vermindert den Tonus der glatten Gefäßmuskulatur und senkt somit den Blutdruck (41), während Promethazin sympathikolytisch und in besonderem Maße vagolytisch wirkt (119). Auf Grund dieser Gegebenheiten dürfte man einen geringeren Blutdruckanstieg bei den Promethazin/Pethidin - Patienten im Vergleich mit den Lormetazepam - Patienten erwarten; das Gegenteil ist der Fall.

Auch die Fremdbeurteilung der Patienten zur Einschätzung ihres Zustandes erscheint sinnvoll; hierfür ist jedoch eine differenziertere Skala zugrunde zu legen, um den vielfältigen Reaktionsweisen der Patienten besser gerecht zu werden. Berücksichtigt werden muß außerdem, daß Fremdbeobachter dazu tendieren, die psychische Reaktionslage des Patienten besser einzuschätzen als dieser selbst (38).

Erlanger Angstskala - Situativ

Die in dieser Studie gefundenen Werte der Erlanger Angstskala - Situativ liegen mit ihrer Höhe im gleichen Bereich wie die für derartige Patienten in der Literatur angegebenen Werte (37,45,121).

Im Gesamtvergleich ergibt sich für beide Medikationsgruppen ein in etwa gleicher Anstieg der situativen Angst.

Der erwartete höhere Anstieg der Werte für die Lor-metazepam - Patienten auf Grund ihrer insgesamt höheren Grundangst ist nicht erkennbar.

Bei der Betrachtung der Ergebnisse der Niedrig- und Hochängstlichen ergibt sich das erwartete Bild (höhere Scorewerte für die Hochängstlichen); der relativ geringe Anstieg der Hochängstlichen in der Promethazin/Pethidin - Gruppe dürfte auf das sehr hohe Werte-Niveau zum Meßzeitpunkt 1 zurückzuführen sein.

Der in beiden Medikationsgruppen etwas höhere Angstanstieg der Männer bei niedrigerer Angstaussgangssituation wurde auch in einer früheren, vergleichbaren Studie gefunden (37).

Die Aufteilung der Ergebnisse nach Repressoren, Normalen und Sensitizern zeigt - wie für das Gesamtkollektiv - die geringen Unterschiede der Erlanger Angst-

skala - Situativ Werte der beiden Medikationsgruppen.

Angst - Visuelle Analogskala

Bei der Auswertung dieses Fragebogens ist eine Betrachtung der einzelnen Items erforderlich.

Die für das Gesamtkollektiv gefundene Überlegenheit des Anxiolytikums Lormetazepam bei der Reduktion der Angst zeigt sich besonders deutlich bei der durch psychische Störfaktoren am wenigsten beeinflussten Gruppe (Normale nach der Unterscheidung durch die Repressions-Sensitizationsskala).

Die Ergebnisse für das Item "niedergeschlagen" zeigen, daß Lormetazepam die Stimmungslage der Patienten verbessert; unter Promethazin/Pethidin kommt es zu einer Verschlechterung der Stimmung. Dies wird auch durch andere Untersuchungen bestätigt (39).

Diese unterschiedliche Wirkung der Medikamente auf die Befindlichkeit spiegelt sich auch in dem signifikant größeren Schwächegefühl der Promethazin/Pethidin - Patienten wieder.

Das Ergebnis, daß die Promethazin/Pethidin - Patienten deutlich müder sind, zeigt sich ebenfalls in einer früheren Studie (39). Dies überrascht nicht, da von der Kombination Promethazin/Pethidin eine stärkere sedative Wirkung zu erwarten war.

Vergleich Erlanger Angstskala - Situativ/ Angst - Visuelle Analogskala

Bei der Betrachtung der Ergebnisse der Erlanger Angstskala - Situativ und der Angst - Visuellen Analogskala sollte man sich die besondere Situation der Patienten auf dem Operationstisch vergegenwärtigen. Der Patient

ist eher bereit, einfach strukturierte Fragen zu beantworten, als detailliert aufgebaute Fragebögen, die in dieser Ausnahmesituation konzentriertere Überlegungen erfordern.

Bei der Angst - Visuellen Analogskala hat der Patient die Möglichkeit, seine Stimmungslage einfacher zu äußern. Auf Grund dieser einfachen Handhabung scheint eine visuelle Analogskala den anderen Fragebogenmethoden überlegen (118).

5.3. Akzeptanz der Applikationsform

Die sublinguale/buccale Einnahme bzw. Gabe der Oblate bereitete weder den Patienten noch dem Pflegepersonal nennenswerte Probleme.

Bei der intramuskulären Injektion kam es zu keinen Komplikationen. Die Patienten gaben nach Erhalt der Spritze nur wenig Schmerzen an; bei der Bewertung dieser Antwort muß die übliche Erwartungshaltung gegenüber einer Spritze (Schmerzen !) mit berücksichtigt werden. Die Bevorzugung der Spritze durch einige Patienten dürfte mit einer gewissen Skepsis gegenüber der Wirkung einer kleinen Oblate im Vergleich mit einer Injektion erklärbar sein. Diese Patienten lassen sich jedoch keiner bestimmten Gruppe zuordnen.

Zusammengefasst resultiert aus den Ergebnissen in Bezug auf die Akzeptanz eine deutliche Bevorzugung der sublingualen/buccalen Gabe gegenüber der intramuskulären Verabreichung. Dies gilt sowohl für die Patienten, als auch in noch deutlicherer Ausprägung für das Pflegepersonal.

Das Pflegepersonal gab außerdem den Eindruck wieder, daß die Patienten die Oblate besser akzeptierten. Zu diesem an sich nicht erstaunlichen Ergebnis kamen auch andere Untersuchungen (47,67).

Nach all diesen Erkenntnissen ist im Normalfall für einen wachen kooperativen Patienten kein Grund für eine intramuskuläre Prämedikation ersichtlich.

5.4. Zusammenfassende Bewertung der Studie

Die Meßanordnung zur Bewertung der Prämedikation ermöglichte eine gute Beurteilung der Medikationswirkungen. Die Kenntnis der vorhandenen Angstbewältigungsmechanismen und der vorliegenden Grundangst ("trait"-Angst) trug zur Objektivierung der Bewertung der situativen Angst ("state"-Angst) bei.

Bei der Anxiolyse und der positiven Beeinflussung der Befindlichkeit (Niedergeschlagenheit, Schwäche) zeigt sich die Prämedikation mit Lormetazepam der mit Promethazin/Pethidin überlegen.

Die Kombination Promethazin/Pethidin bewirkt darüberhinaus eine signifikant größere Müdigkeit der Patienten. Dies kann als erwünschte Wirkung betrachtet werden. Im Zusammenhang mit der Verschlechterung der Befindlichkeit jedoch bietet die Sedierung für den Patienten keinen Vorteil.

Die Fragestellung intramuskuläre oder sublinguale/buccale Prämedikation wurde ganz eindeutig sowohl von den Patienten als auch vom Pflegepersonal zugunsten der sublingualen/buccalen Verabreichungsform entschieden. In diesem Zusammenhang erscheint interessant, wie eine entsprechende Untersuchung ergab, daß ein Benzodiazepin bei sublingualer Gabe besser wirksam war als bei intramuskulärer Applikation (43).

6. Zusammenfassung

Es wurde eine kontrollierte klinische Studie mit Doppelblindcharakter durchgeführt.

Verglichen wurde die Prämedikationswirkung von Lormetazepam sublingual/buccal mit Promethazin/Pethidin intramuskulär bei 80 Patienten, die randomisiert zwei Gruppen zugeordnet wurden.

Das Meßmodell zum Vergleich der Prämedikationswirkung umfasste die Feststellung von Angstabwehrmechanismen, der Grundangst und den Verlauf der situativen Angst; die situative Angst wurde durch objektiv messbare Parameter, Fremd- und Selbstbeurteilungsmethoden erfasst.

Weiterhin wurde die Akzeptanz der unterschiedlichen Applikationsformen ermittelt.

Bei der Prämedikationswirkung erweist sich Lormetazepam hinsichtlich Anxiolyse und Beeinflussung der Befindlichkeit der Kombination Promethazin/Pethidin überlegen; der sedierende Effekt von Promethazin/Pethidin ist deutlicher ausgeprägt.

Die sublinguale/buccale Verabreichungsform wird eindeutig der intramuskulären vorgezogen.

7. Anhang - Abbildungen / Tabellen

Anhang: Abbildungen

- Abb. 1 Versuchsablauf
- Abb. 2 Anamnesebogen der Anästhesistin
- Abb. 3 Angstfragebogen situativ (Nisbet/Norris)
- Abb. 4 Repressions-Sensitizations-Skala
- Abb. 5 STAI-G-X2
- Abb. 6 Erlanger Angstskala - Situativ
- Abb. 7 Angst - Visuelle Analogskala (VAS)
- Abb. 8 Akzeptanzfragebogen Spritze/Oblate - Patient
- Abb. 9 Akzeptanzfragebogen Spritze/Oblate - Schwester
- Abb. 10 Angstfragebogen situativ - Verlauf von Herzfrequenz und Blutdruck
- Abb. 11 Veränderungen von Herzfrequenz und Blutdruck zwischen Meßzeitpunkt 1 und Meßzeitpunkt 3
- Abb. 12 Erlanger Angstskala - Situativ
Verlauf der situativen Angst
- Abb. 13 Angst - Visuelle Analogskala
Medikationswirkung: Veränderungen von Meßzeitpunkt 2 gegenüber Meßzeitpunkt 1
- Abb. 14 Akzeptanz von Spritze/Oblate durch die Patienten
- Abb. 15 Akzeptanz von Spritze/Oblate durch die Schwestern
- Abb. 16 Sequentialanalyse - Angst - Visuelle Analogskala
Reduktion der Angst
- Abb. 17 Sequentialanalyse - Angst - Visuelle Analogskala
Reduktion der Niedergeschlagenheit
- Abb. 18 Sequentialanalyse - Angst - Visuelle Analogskala
Reduktion des Schwächegefühls
- Abb. 19 Sequentialanalyse - Angst - Visuelle Analogskala
Reduktion der Müdigkeit

Anhang: Tabellen

- Tab. 1 Anamnesedaten - Unterteilung nach Medikation
- Tab. 2 Anamnesedaten - Unterteilung der Medikationsgruppen nach Geschlecht
- Tab. 3 Anamnesedaten - Altersverteilung in den Medikationsgruppen
- Tab. 4 Angstfragebogen situativ - Ergebnisse unterteilt nach Medikation
- Tab. 5 Repressor-Sensitizer-Skala - Ergebnisse unterteilt nach Medikation
- Tab. 6 Repressor-Sensitizer-Skala - Ergebnisse unterteilt nach Geschlecht
- Tab. 7 STAI-G-X2 - Ergebnisse unterteilt nach Medikation und Geschlecht
- Tab. 8 STAI-G-X2 - Ergebnisse; Unterteilung in Hoch- und Niedrigängstliche
- Tab. 9 STAI-G-X2 - Ergebnisse; Unterteilung der Hoch- und Niedrigängstlichen nach Geschlecht
- Tab. 10 Erlanger Angstskala situativ - Ergebnisse unterteilt nach Medikation
- Tab. 11 Erlanger Angstskala situativ - Ergebnisse unterteilt nach Geschlecht und Medikation
- Tab. 12 Erlanger Angstskala situativ - Ergebnisse der Niedrig- und Hochängstlichen, Repressoren, Normalen und Sensitizer
- Tab. 13 Angst - Visuelle Analogskala - Ergebnisse unterteilt nach Medikation
- Tab. 14 Angst - Visuelle Analogskala - Vergleich der Differenz der Scorewerte
- Tab. 15 Angst - Visuelle Analogskala - Begriffspaar 'gelassen' - 'ängstlich' Ergebnisse der Niedrig- und Hochängstlichen, Repressoren, Normalen und Sensitizer

- Tab. 16 Angst - Visuelle Analogskala: Begriffspaar
'hoffnungsvoll' - 'niedergeschlagen' Ergebnisse der
Niedrig- und Hochängstlichen, Repressoren, Normalen
und Sensitizer
- Tab. 17 Angst - Visuelle Analogskala: Begriffspaar 'stark' -
'schwach' Ergebnisse der Niedrig- und Hochängstlichen,
Repressoren, Normalen und Sensitizer
- Tab. 18 Angst - Visuelle Analogskala: Begriffspaar
'hellwach' - 'todmüde' Ergebnisse der Niedrig- und
Hochängstlichen, Repressoren, Normalen und Sensitizer

Abb. 1 Versuchsschablauf

Tag	Zeit	Ort	n Patienten	Medikation	Tests
Tag vor der Operation	nachmittags	Station	80		Prämedikationsvisite (standardisiert) zur Erhebung der Anamnesedaten der Patienten; Angstfragebogen situativ : Fremdbeurteilung der Angst durch die Anästhesistin; Messung von Herzfrequenz und Blutdruck; Repressions - Sensitizations - Skala, STAI-G-X2, Erlanger Angstskala - Situativ, Angst - Visuelle Analogskala
	abends	Station	80	1mg Lormetazepam per os	
Tag der Operation	30-45 min präoperativ	Station	40	2mg Noctamid ^R sublingual/buccal (= 2 Oblaten) + 3ml NaCl i.m.	Fragebogen zur Akzeptanz - Patient; Fragebogen zur Akzeptanz - Schwestern;
			40	2 Placebo-Oblaten sublingual/buccal + 50mg Atosil ^R + 50mg Dolantin ^R (= 3 ml) i.m.	
	Nach Umlagern auf den OP-Tisch	OP-Vorraum	80		Angstfragebogen situativ : Fremdbeurteilung der Angst durch die Anästhesistin; Messung von Herzfrequenz und Blutdruck; Erlanger Angstskala - Situativ, Angst - Visuelle Analogskala
	Nach Legen der Infusion				Messung von Herzfrequenz und Blutdruck

Abb. 2 Anamnesebogen der Anästhesistin

Pat.Nr.	Testcode	Prüftag	MeßzeitNr.
_____	_____	_____	_____
Tag	Monat	Jahr	
_____	_____	_____	
Geb.Datum	Körpergewicht	Körpergröße	
_____	_____	_____	
Op.-Beginn	Op-Dauer		
_____	_____		

Operation

Zahl d.Operationen: _____

Zahl d.Vollnarkosen: _____

Zahl d.Zahnarztanarkosen: _____

Zahl d.Krankenhausaufenthalte: _____

Risikogruppe: (I) (II) (III)

Geschlecht: weibl.: __ männl.: __

Sonstiges: _____

Abb. 3 Angstfragebogen situativ (Nisbet/Norris)

Pat.Nr.: Prüftag:..... Meßzeitp.:.....

Vor Prämedikation:

ängstlich	☐
voll wach	☐
schläfrig (entspannt)	☐

RR

Puls

Nach Umlagerung auf OP-Tisch:

ängstlich	☐
voll wach	☐
schläfrig (entspannt)	☐

Nach Anlegen der RR-Manschette:

RR

Puls

Nach Anlegen der Infusion:

RR

Puls

Age Group	1970	1980	1990	2000	2010	2020
0-14	25	22	18	15	12	10
15-24	20	18	15	12	10	8
25-34	15	12	10	8	6	5
35-44	10	8	6	5	4	3
45-54	8	6	5	4	3	2
55-64	5	4	3	2	1	1
65-74	3	4	5	6	8	12
75+	5	8	12	15	20	25

[illegible]

Abb. 5 STAI-G-X2

Anleitung

Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Feststellungen, mit denen man sich selbst beschreiben kann. Bitte lesen Sie jede Feststellung durch und wählen Sie aus den vier Antworten diejenige aus, die angibt, wie Sie sich im **allgemeinen** fühlen. Kreuzen Sie bitte bei jeder Feststellung das Kästchen unter der von Ihnen gewählten Antwort an. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Überlegen Sie bitte nicht lange und denken Sie daran, diejenige Antwort auszuwählen, die am besten beschreibt, wie Sie sich im allgemeinen fühlen.

	fast nie manchmal oft fast immer		fast nie manchmal oft fast immer
21. Ich bin vergnügt	☐ ☐ ☐ ☐	31. Ich neige dazu, alles schwer zu nehmen	☐ ☐ ☐ ☐
22. Ich werde schnell müde	☐ ☐ ☐ ☐	32. Mir fehlt es an Selbstvertrauen	☐ ☐ ☐ ☐
23. Mir ist zum Weinen zumute	☐ ☐ ☐ ☐	33. Ich fühle mich geborgen	☐ ☐ ☐ ☐
24. Ich glaube, mir geht es schlechter als anderen Leuten	☐ ☐ ☐ ☐	34. Ich mache mir Sorgen über mögliches Mißgeschick	☐ ☐ ☐ ☐
25. Ich verpasse günstige Gelegenheiten, weil ich mich nicht schnell genug entscheiden kann	☐ ☐ ☐ ☐	35. Ich fühle mich niedergeschlagen	☐ ☐ ☐ ☐
26. Ich fühle mich ausgeruht	☐ ☐ ☐ ☐	36. Ich bin zufrieden	☐ ☐ ☐ ☐
27. Ich bin ruhig und gelassen	☐ ☐ ☐ ☐	37. Unwichtige Gedanken gehen mir durch den Kopf und bedrücken mich	☐ ☐ ☐ ☐
28. Ich glaube, daß mir meine Schwierigkeiten über den Kopf wachsen	☐ ☐ ☐ ☐	38. Enttäuschungen nehme ich so schwer, daß ich sie nicht vergessen kann	☐ ☐ ☐ ☐
29. Ich mache mir zuviel Gedanken über unwichtige Dinge	☐ ☐ ☐ ☐	39. Ich bin ausgeglichen	☐ ☐ ☐ ☐
30. Ich bin glücklich	☐ ☐ ☐ ☐	40. Ich werde nervös und unruhig, wenn ich an meine derzeitige Angelegenheiten denke	☐ ☐ ☐ ☐
Score 1 ☐ ☐ ☐ ☐			

Abb. 6 Erlanger Angstskala - Situativ

Sie finden hier eine Reihe von Feststellungen, mit der man seinen gegenwärtigen Zustand beschreiben kann. Kreuzen Sie bitte in jeder Zeile die Antwort an, die Ihren Zustand im Augenblick am besten wiedergibt.

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Ich bin im Augenblick zuversichtlich | |
| 2. Ich bin jetzt aufgeregt | ☐ sehr |
| 3. Ich habe jetzt Herzklopfen | ☐ ziemlich |
| 4. Ich bin jetzt verkrampft | ☐ wenig |
| 5. Ich bin jetzt nervös | ☐ gar nicht |
| 6. Ich bin jetzt gut gelaunt | |
| 7. Ich habe jetzt einen trockenen Mund | |
| 8. Ich mache mir jetzt Sorgen, daß etwas schiefgehen könnte | |
| 9. Ich habe ein komisches Gefühl im Magen | |
| 10. Ich bin jetzt ängstlich | |
| 11. Ich fühle mich jetzt bedroht | |
| 12. Ich bin jetzt verärgert | |
| 13. Ich fühle mich jetzt innerlich angespannt | |
| 14. Ich schwitze im Augenblick an den Händen | |
| 15. Ich bin jetzt bedrückt | |
| 16. Ich bin jetzt unruhig | |
| 17. Ich bin jetzt gereizt | |
| 18. Ich fühle mich im Augenblick hilflos | |
| 19. Ich bin jetzt zappelig | |
| 20. Ich fühle mich im Augenblick unsicher | |
| 21. Ich fühle mich jetzt ausgeliefert | |
| 22. Ich bin jetzt durcheinander | |
| 23. Ich habe im Augenblick ein beklemmendes Gefühl | |
| 24. Ich fühle mich jetzt verlassen | |

Abb. 7 Angst - Visuelle Analogskala (VAS)

Pat .Nr. Prüftag Meßzeitp.

ANGST - VAS

Bitte geben Sie durch einen kleinen senkrechten Strich auf jeder der Linien an, wie Sie sich im Moment fühlen. Bitte antworten Sie ehrlich und spontan. Sie haben die ganze Linie zur Verfügung, um an der am ehesten passenden Stelle Ihren Strich zu machen.


Ich fühle mich im Moment:

schrecklich
ängstlich




unerschütterlich
gelassen

schrecklich
niederge-
schlagen



sehr
hoffnungsvoll

furchtbar
schwach



ausgesprochen
stark

todmüde



hellwach

Abb. 10 Angstfragebogen situativ - Verlauf von Herzfrequenz und Blutdruck




Abb. 11 Veränderungen von Herzfrequenz und Blutdruck
zwischen Meßzeitpunkt 1 und Meßzeitpunkt 3




Abb. 12 Erlanger Angstskala situativ
Verlauf der situativen Angst




Abb. 13 Angst - Visuelle Analogskala
Medikationswirkung: Veränderungen von Meßzeitpunkt 2 gegenüber Meßzeitpunkt 1




Abb. 14 Akzeptanz von Spritze/Oblate durch die Patienten




Abb. 15 Akzeptanz von Spritze/Oblate durch die Schwestern





Abb. 16 Sequentialanalyse

Angst - Visuelle Analogskala: Reduktion der Angst




Neue Behandlung = Lormetazepam

Alte Behandlung = Promethazin/Pethidin

Abb. 17 Sequentialanalyse

Angst - Visuelle Analogskala: Reduktion der
Niedergeschlagenheit




Neue Behandlung = Lormetazepam

Alte Behandlung = Promethazin/Pethidin

Abb. 18 Sequentialanalyse

Angst - Visuelle Analogskala: Reduktion des
Schwächegefühls




Neue Behandlung = Lormetazepam

Alte Behandlung = Promethazin/Pethidin

Abb. 19 Sequentialanalyse

Angst - Visuelle Analogskala: Reduktion der
Müdigkeit



Neue Behandlung = Lormetazepam

Alte Behandlung = Promethazin/Pethidin

Tab. 1 Anamnesedaten - Unterteilung nach Medikation

	Total		Lormetazepam		Promethazin/ Pethidin	
	n = 80		n = 40		n = 40	
männlich	36		21		15	
weiblich	44		19		25	
	$\bar{x}$	s	$\bar{x}$	s	$\bar{x}$	s
Alter (Jahre)	33,0	10,8	33,2	10,4	32,8	11,4
Gewicht (kg)	70,5	10,7	70,8	10,4	70,2	11,1
Größe (cm)	169,2	8,6	170,2	8,5	168,1	8,6
Narkose- erfahrung (Anzahl)	1,2	1,1	1,4	1,1	1,1	1,0
Operations- Dauer (Minuten)	58,1	40,7	59,1	39,9	57,1	42,0

Tab. 2 Anamnesejaten - Unterteilung der Medikationsgruppen nach Geschlecht

Medikation	Geschlecht	n	Alter (Jahre)	Gewicht (kg)	Größe (cm)	Narkose- erfahrung (Anzahl)	Operations- Dauer (Minuten)
Lormetazepam n = 40	männlich	21	$\bar{x}$ 31,7 s	75,5 10,2	176,2 5,9	1,4 1,1	63,1 42,1
	weiblich	19	$\bar{x}$ 34,7 s 10,3	65,6 8,0	163,5 5,3	1,4 1,3	54,7 38,0
Promethazin/ Pethidin n = 40	männlich	15	$\bar{x}$ 29,5 s 12,7	76,5 9,2	176,1 6,2	0,8 0,8	54,3 39,5
	weiblich	25	$\bar{x}$ 34,7 s 10,4	66,4 10,4	163,2 5,7	1,2 1,0	58,8 44,1

Tab. 3 Anamnesedaten - Altersverteilung in den Medikationsgruppen

Alter (Jahre)	Lormetazepam	Promethazin/ Pethidin
	n = 40	n = 40
18 - 29	18	18
30 - 39	11	10
40 - 49	9	10
50 - 60	2	2

Tab. 4 Angstfragebogen situativ - Ergebnisse unterteilt nach Medikation

	Lormetazepam		Promethazin/ Pethidin	
	$\bar{x}$	s	$\bar{x}$	s
Score 1	6,45	1,50	7,25	2,77
Score 2	7,63	1,67	7,80	1,93
Score 3	10,35	1,89	10,27	2,81

Score 1 = Summe der objektiven Kriterien (Herzfrequenz/
Blutdruck)

Score 2 = Score 1 + Fremdbeurteilung der Zustandsänderung

Score 3 = Score 2 + Fremdbeurteilung des Zustandes des
Patienten

Tab. 5 Repressor-Sensitizer-Skala - Ergebnisse unterteilt nach Medikation

	Score	Lormetazepam n = 40	Promethazin/ Pethidin n = 40
Repressor	≤ 25	19	20
"Normale"	$> 25 < 49$	13	15
Sensitizer	≥ 49	8	5

Tab. 6 Repressor-Sensitizer-Skala - Ergebnisse unterteilt nach Geschlecht

	Score	männlich n (% Anteil)	weiblich n (% Anteil)
Repressor	≤ 25	17 (47%)	22 (50%)
"Normale"	$> 25 < 49$	10 (28%)	18 (41%)
Sensitizer	≥ 49	9 (25%)	4 (9%)
total		36 (100%)	44 (100%)

Tab. 7 STAI-G-X2 - Ergebnisse unterteilt nach Medikation und Geschlecht

	Lormetazepam		Promethazin/ Pethidin	
	$\bar{x}$	s	$\bar{x}$	s
total	38,7	9,2	35,8	8,1
männlich	38,6	9,8	36,9	10,1
weiblich	38,8	8,8	35,1	6,7

Tab. 8 STAI-G-X2 - Ergebnisse; Unterteilung in Hoch- und Niedrigängstliche

	Score	Lormetazepam	Promethazin/ Pethidin
		n = 40	n = 40
Niedrig- ängstliche	≤ 35	16	21
Hoch- ängstliche	> 35	24	19

Tab. 9 STAI-G-X2 - Ergebnisse; Unterteilung der Hoch- und Niedrigängstlichen nach Geschlecht

Geschlecht	n	Hoch- ängstliche	Niedrig- ängstliche
männlich	36	21	15
weiblich	44	22	22

Tab. 10 Erlanger Angstskala situativ - Ergebnisse unterteilt nach Medikation

	Lormetazepam		Promethazin/ Pethidin		U-Test
	$\bar{x}$	s	$\bar{x}$	s	
Tag vor der Operation	38,0	8,8	39,0	9,0	n.s.
präoperativ	42,4	12,1	42,0	9,6	n.s.

Tab. 11 Erlanger Angstskala situativ
Ergebnisse unterteilt nach Geschlecht und Medikation

	Lormetazepam		Promethazin/ Pethidin	
	$\bar{x}$	s	$\bar{x}$	s
Tag vor der Operation				
männlich	36,1	9,7	37,3	5,6
weiblich	40,1	7,4	39,8	10,5
präoperativ				
männlich	41,8	13,6	41,7	10,0
weiblich	43,3	10,9	42,2	9,6

Tab. 12 Erlanger Angstskala situativ
Ergebnisse der Niedrig- und Hochhängstlichen, Repressoren, Normalen und Sensitizer

	Lormetazepam				Promethazin/Pethidin				U-Test
	n	MZP 1	MZP 2	Wilcoxon-Test	n	MZP 1	MZP 2	Wilcoxon-Test	
Niedrighängstliche	16	35,4	38,9	< 0,05	21	33,7	37,4	< 0,05	n.s.
Hochhängstliche	24	39,8	44,8	< 0,05	19	44,8	47,1	n.s.	n.s.
Repressoren	19	35,1	39,7	< 0,05	20	34,6	38,1	< 0,05	n.s.
Normale	13	39,5	45,5	n.s.	15	43,5	47,3	n.s.	n.s.
Sensitizer	8	42,5	43,9	n.s.	5	42,6	41,8	n.s.	n.s.

MZP 1 = Meßzeitpunkt 1 = Tag vor der Operation MZP 2 = Meßzeitpunkt 2 = präoperativ

Tab. 13 Angst - Visuelle Analogskala

Ergebnisse unterteilt nach Medikation

	Lormetazepam		Promethazin/ Pethidin	
	$\bar{x}$	s	$\bar{x}$	s
Tag vor der Operation				
ängstlich	41,7	27,8	35,0	23,9
niedergeschlagen	31,9	23,0	26,0	18,9
schwach	36,3	22,8	32,4	19,7
todmüde	27,6	17,3	26,7	22,4
präoperativ				
ängstlich	32,6	27,4	38,7	26,0
niedergeschlagen	27,6	21,8	31,8	24,7
schwach	37,1	21,9	47,0	25,2
todmüde	31,5	21,4	44,4	26,8
Wilcoxon-Test				
ängstlich	< 0,05		n.s.	
niedergeschlagen	n.s.		n.s.	
schwach	n.s.		< 0,05	
todmüde	n.s.		< 0,05	

Tab. 14 Angst - Visuelle Analogskala

Vergleich der Differenz der Scorewerte
(Scorewert präoperativ minus Scorewert am Tag vor
der Operation)

	Lormetazepam		Promethazin/ Pethidin		U-Test
	$\bar{x}$	s	$\bar{x}$	s	
ängstlich	-9,2	23,8	+3,7	24,6	n.s.
niedergeschlagen	-4,3	22,9	+5,8	22,2	n.s.
schwach	+0,7	22,9	+14,6	22,7	< 0,05
todmüde	+3,9	25,2	+17,7	26,5	< 0,05

Tab. 15 Angst - Visuelle Analogskala: Begriffspaar 'gelassen' - 'ängstlich'
Ergebnisse der Niedrig- und Hochhängstlichen, Repressoren, Normalen und Sensitizer

	Lormetazepam			Wilcoxon- Test	Promethazin/Pethidin			U-Test
	n	MZP 1	MZP 2		n	MZP 1	MZP 2	
Niedrighängstliche	16	35,4	21,2	< 0,05	21	28,6	33,6	n.s.
Hochhängstliche	24	46,0	40,1	n.s.	19	42,1	44,3	n.s.
Repressoren	19	37,6	28,4	n.s.	20	33,1	31,0	n.s.
Normale	13	50,4	37,2	n.s.	15	38,7	52,0	n.s.
Sensitizer	8	37,4	34,6	n.s.	5	31,6	29,8	n.s.

MZP 1 = Meßzeitpunkt 1 = Tag vor der Operation MZP 2 = Meßzeitpunkt 2 = präoperativ

Tab. 16 Angst - Visuelle Analogskala: Begriffspaar 'hoffnungsvoll' - 'niedergeschlagen'
Ergebnisse der Niedrig- und Hochängstlichen, Repressoren, Normalen und Sensitizer

	Lormetazepam			Wilcoxon-Test	Promethazin/Pethidin			Wilcoxon-Test	U-Test
	n	MZP 1	MZP 2		n	MZP 1	MZP 2		
Niedrigängstliche	16	25,6	22,9	n.s.	21	20,7	28,8	n.s.	n.s.
Hochängstliche	24	36,1	30,7	n.s.	19	31,8	35,2	n.s.	n.s.
Repressoren	19	28,1	24,2	n.s.	20	23,4	27,8	n.s.	n.s.
Normale	13	34,3	31,8	n.s.	15	31,9	37,7	n.s.	n.s.
Sensitizer	8	36,9	28,8	n.s.	5	18,8	30,2	n.s.	n.s.

MZP 1 = Meßzeitpunkt 1 = Tag vor der Operation MZP 2 = Meßzeitpunkt 2 = präoperativ

Tab. 17 Angst - Visuelle Analogskala: Begriffspaar 'stark' - 'schwach'
Ergebnisse der Niedrig- und Hochhängstlichen, Repressoren, Normalen und Sensitizer

	Lormetazepam			Wilcoxon-Test	Promethazin/Pethidin			U-Test	
	n	MZP 1	MZP 2		n	MZP 1	MZP 2		Wilcoxon-Test
Niedrighängstliche	16	26,5	33,1	n.s.	21	24,5	38,3	< 0,05	n.s.
Hochhängstliche	24	42,9	39,7	n.s.	19	41,0	56,5	< 0,05	< 0,05
Repressoren	19	31,6	34,1	n.s.	20	27,6	38,3	n.s.	n.s.
Normale	13	43,1	44,7	n.s.	15	36,7	54,7	< 0,05	n.s.
Sensitizer	8	36,2	31,6	n.s.	5	38,6	58,4	n.s.	< 0,05

MZP 1 = Meßzeitpunkt 1 = Tag vor der Operation MZP 2 = Meßzeitpunkt 2 = präoperativ

Tab. 18 Angst - Visuelle Analogskala: Begriffspaar 'hellwach' - 'todmüde'
Ergebnisse der Niedrig- und Hochhängstlichen, Repressoren, Normalen und Sensitizer

	Lormetazepam				Promethazin/Pethidin				U-Test
	n	MZP 1	MZP 2	Wilcoxon-Test	n	MZP 1	MZP 2	Wilcoxon-Test	
Niedrighängstliche	16	21,9	29,8	n.s.	21	19,2	42,6	< 0,05	n.s.
Hochhängstliche	24	31,9	32,7	n.s.	19	35,0	46,4	< 0,05	n.s.
Repressoren	19	23,4	34,3	< 0,05	20	23,1	40,5	< 0,05	n.s.
Normale	13	31,8	32,7	n.s.	15	30,6	51,4	< 0,05	< 0,05
Sensitizer	8	31,0	23,0	n.s.	5	29,4	39,2	n.s.	n.s.

MZP 1 = Meßzeitpunkt 1 = Tag vor der Operation MZP 2 = Meßzeitpunkt 2 = präoperativ

8. Literaturverzeichnis

1. Andrew JM (1970) Recovery from surgery, with and without preparatory instruction, for three coping styles. J.Pers.Social Psychology 15: 223
2. Auerbach SM (1973) Trait-state anxiety and adjustment to surgery. J.Consult Clin. Psychol. 40: 264
3. Auerbach SM, Kilman PR (1977) Crisis intervention: a review of outcome research. Psychol. Bull. 84: 1189
4. Berlin J, Frenzel O, Berlin B, Pfeiffer J, Rey E, Tolksdorf W (1982) Die subjektive Befindlichkeit des Patienten und ihre Auswirkung auf den intra- und postoperativen Verlauf. Prakt. Anästh. 1
5. Bienert H (1967) Promethazin zur Vorbeugung und Behandlung störender Nebenwirkungen bei neuro- und thymoleptischer Medikation. Med. Welt 18: 957
6. Biscoping J, Seidlmayer E (1984) Vergleichende Untersuchungen bei oraler und intramuskulärer Prämedikation von Kindern Anästh. Intensivmed. 25: 296
7. Bond A, Lader M (1974) The use of analogue scales in rating subjective feelings. Br. J. med. Psychol. 47: 211
8. Boyle P, Paybrook GD (1977) The interrelation of personality and postoperative factors. Br. J. Anaest. 49: 259
9. Briggs RM, Ogg MJ (1973) Patients' refusal of surgery after Innovar premedikation. Plast. Reconstr. Surg. 51: 158
10. Brockmann AW (1974) Das limbische System. Medizin 16: 493
11. Bross J (1952) Sequential medical plans. Biometrics 8: 188
12. Butollo W (1978) Verhaltenstheorie und -therapie chronischer Angstreaktionen. Med. Klin. 73: 1135
13. Butollo W (1979) Chronische Angst. Urban & Schwarzenberg, München
14. Butollo W (1982) Präoperative Angst und ihre Bewältigung. Vortrag bei der Deutschen Gesellschaft f. Anästhesiologie und Intensivmedizin, Wiesbaden

15. Byrne D (1961) The Repression-Sensitization Scale: Rationale, reliability and validity. *Journal of Personality* 29: 334
16. Byrne D (1964) Repression-Sensitization as a dimension of personality. In: BA Maher (Ed) *Progress in experimental personality research*. Academic Press, New York Vol. 1: 170
17. Cattell RB, Scheier IH (1961) *The meaning and measurement of neuroticism and anxiety*. Ronald Press, New York
18. CIPS - Collegium (1981) *Intern. Skalen für Psychiatrie*. Beltz GmbH, Weinheim
19. Cohen F, Lazarus R (1973) Active coping processes, coping dispositions and recovery from surgery. *Psychosom. Med.* 35: 375
20. Cole LC (1962) A closed sequential test design for toleration experiments. *Ecology* 43: 749
21. Conner JT (1978) Sedation vs. relief of anxiety. *Anesthesiology* 48: 300
22. Corman HH, Hornick EJ, Kritchman M, Terestma N (1958) Emotional reaction of surgical patients to hospitalization, anesthesia and surgery. *Amer. J. Surg.* 96: 646
23. Cronin M, Redfern PA, Utting JE (1973) Psychometry and postoperative Complaints in Surgical Patients. *Brit. J. Anaesth.* 45: 879
24. Davies-Osterkamp (1977) Angst und Angstbewältigung bei chirurgischen Patienten. *Med. Psychol.* 3: 169
25. Doenicke A, Kugler J, Kropp M, Laub M, Kalbfleisch G (1979) Der hypnotische Effekt des neuen Benzodiazepinderivates Lormetazepam nach intravenöser Injektion. *Anaesthesist* 28: 578
26. Doenicke A, Kugler J, Laub M, Dittmann J, Hug P (1980) Lormetazepam bei Etomidatnarkosen, verglichen mit Diazepam In: A Doenicke, H Ott, Lormetazepam (Noctamid^R) Springer, Berlin, Heidelberg, New York 10.1
27. Doenicke A, Suttman H, Kapp W, Kugler J, Ebentheuer H (1984) Zur Wirkung des Benzodiazepin-Antagonisten RO 15-1788 *Anaesthesist* 33: 343
28. Dony M (1982) *Psych. Aspekte im Bereich der Anästhesie* In: Beckmann D, et al. *Med. Psychologie* Springer, Berlin

29. Dudziak R (1982) Lehrbuch der Anästhesiologie. Schattauer, Stuttgart, New York
30. Dundee JW, Moore J, Nicholl RM (1962) Studies of Drugs given before Anesthesia I: A Method of Pre-operative assessment. Brit. J. Anesth. 34: 458
31. Dundee JW, Haslett WHK (1970) The benzodiazepines: a review of their actions and uses relative to anaesthetic practis. Brit. J. Anaesth. 42: 217
32. Egbert LD, Battit GE, Turndorf H, Beecher HK (1963) The value of preoperative visit by an anesthesist. A study of doctor-patient rapport. J. amer. Med. Ass. 185: 553
33. Egbert LD, Battit GE, Welch GE, Bartlett MK (1964) Reduction of postoperative pain by encouragement and instruction. New Engl. J. Med. 270: 825
34. Elhardt S (1980) Tiefenpsychologie. Eine Einführung Verlag W. Kohlhammer Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz
35. Enke H, Ferchland-Enke E, Malzahn B, Pohlmeier H, Speierer GW, Troschke Jv (1976) Lehrbuch der Medizinischen Psychologie. Urban & Schwarzenberg München, Berlin, Wien
36. Epstein S (1972) The nature of Anxiety with emphasis upon its relationship to expectancy. In: Spielberger CD (Ed) Anxiety Vol. II, Academic Press, New York
37. Eser A (1983) Messung der Anxiolyse bei Prämedikation: Lormetazepam - Thalamonal^R. München: Dissertation
38. Fitzal S, Knapp-Groll E, Ilias W, Scherzer W, Tonczar L (1979) Vergleich zweier Prämedikationsmethoden: Psychische, sedative und somatische Reaktionen. Anaesthesist 28: 572
39. Fitzal S, Groll-Knapp E, Länger W, Riegler R (1983) Prämedikation mit Flunitrazepam, Lormetazepam oder Pethidin-Promethazin. Anaesthesist 32: 295
40. Forrest WH, Brown CR, Brown BW (1977) Subjective responses to six preoperative medications. Anesthesiology 47: 241
41. Forth W, Henschler D, Rummel W (1984) Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie. Bibliographisches Institut Mannheim, Wien, Zürich
42. Gabay S, Huang PC (1974) The Binding behavior of phenothiazines and structurally related compounds to albumin from several species. In: Forrest IS, Carr CJ, Uschin E The Phenothiazines and Structurally Related Drugs Raven Press New York

43. Gale GD, Gallon S, Porter WR (1983) Sublingual lorazepam: a better premedikation? *Brit. J. Anaesth.* 55: 761
44. Galster JV, Druschky KF (1975) Bedingungen für Indikatorfragen zur Einschätzung des Patientenverhaltens. In: Rögheimer E, Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft f. Anästhesiologie und Wiederbelebung, Erlangen
45. Galster JV, Spörl G (1979) Entwicklung einer Skala zur Quantifizierung transitorischer und habitueller Angstzustände. *Neurol. Psychiatrie* 5: 223
46. Glanzmann P, Laux L (1978) The effects of trait anxiety and two kinds of stressors on state anxiety and performance. In: Spielberger CD, Sarason IG (Eds) *Stress and Anxiety* (Vol.5 Washington: Hemisphere/Wiley
47. Grabow L, Hein A, Hendrix B, Thiel W, Schilling E (1986) Gleichwertigkeit von oraler und intramuskulärer Prämedikation I. Orale versus intramuskuläre Prämedikation. *Anästh. Intensivther. Notfallmed.* 21: 13
48. Heidrich H, Ott H, Beach RC (1981) Lormetazepam - A benzodiazepine derivate without hangover effect? A double-blind study with chronic insomniacs in a general practice setting. *Int. J. of Clin. Pharmacology, Therapy and Toxicol.* Vol.19 No.1: 11
49. Hein A, Grabow L (1985) Orale Prämedikation. *Anästhesist* 34: 190
50. Hjortso E, Mondorf T (1982) Does oral premedication increase the risk of gastric aspiration? A study to compare the effect of diazepam given orally and intramuscularly on the volume and activity of gastric aspirate. *Acta Anaesth. Scand.* 26: 505
51. Höfling S, Dworzak H, Butollo W, Neef W (1983) Der Angstprozeß unter verschieden hohen Thalamonal Dosen zur Prämedikation. *Anästhesist* 32: 512
52. Hümpel M, Illi V, Milius W, Wendt H, Kurowski M (1979) The Pharmacokinetics and Biotransformation of the New Benzodiazepine Lormetazepam in Humans. I. Absorption, Distribution, Elimination and Metabolism of Lormetazepam-5-14 C. *European J. of Drug Metabolism and Pharmacokinetics*, No.4: 237
53. Hümpel M, Nieuweboer B, Milius W, Hanke H, Wendt H (1980) Kinetics and biotransformations of lormetazepam. II. Radioimmunologic determinations in plasma and urine of young and elderly subjects: First-pass effect *Clin. Pharmacol. Ther.* 28,5: 673

54. Janis IL (1958) Psychological stress-psychoanalytic and behavioural studies of surgical patients. Wiley, New York
55. Janis IL (1974) Psychological stress. Wiley, New York
56. Jenner L, Blom GE, Waldvogel S (1952) Emotional implications of tonsillectomy and adenoidectomy on children. *Psychoanal. Study Child* 7: 126
57. Johnson JE, Leventhal H, Dabbs JM (1971) Contribution of emotional and instrumental response processes in adaptation to surgery. *J. Pers. Soc. Psychol.* 20: 55
58. Johnson JE, Leventhal H (1974) Effects of accurate expectations and behavioral instructions on reactions during a noxious medical examination. *J. Pers. Soc. Psychol.* 29 (5): 710
59. Jovanovic UJ, Ott H, Heidrich H, Stephan K, Schratzer M (1980) Age-Spezifische Dosis von Lormetazepam als Nacht Sedative in Fällen von Chronischer Schlafstörung. *Waking and Sleeping* 4: 223
60. Kanto J (1981) Benzodiazepines as premedicants *Br. J. Anaesth.* 53: 1179
61. Kanto J, Leppänen T, Kangas L (1984) Vergleichende Untersuchungen von oralen Gaben Flunitrazepam und intramuskuläre Verabreichung von Atropin und Pethidin (Meperidin) als Prämedikation. *Anaesthesist* 33: 133
62. Kendall PC, Williams L, Pechalek TF, Shisslak C, Herzoff N (1979) Cognitive-behavioral and patient education interventions in cardiac catheterization procedures. *J. Consult. Clin. Psychol.* 47: 49
63. Klein HE, Hippius H (1983) Angst - Diagnostik und Therapie Adam Pharma Verlag, Essen
64. Klotz U (1984) Einfluß des Alters einiger Medikamente auf die Pharmakologie der Benzodiazepine. *Anaesthesist* 33: 529
65. Krohne HW (1974) Untersuchungen mit einer deutschen Form der Repression-Sensitization-Skala. *Ztschr. f. klin. Psychol.* 3: 238
66. Krohne HW (1975) Angst und Angstverarbeitung Kohlhammer Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz

67. Krüsmann R (1984) Lormetazepam bei Narkosen in der Gynäkologie. Anaesthesist 33: 537
68. Kugler J, Doenicke A, Suttman H, Laub M, Speth M, Woeller L (1980) Ein Vergleich der hypnot. Effekte von Flunitrazepam und Lormetazepam. In: Doenicke A, et al (Ed) Lormetazepam - Noctamid(R). Anaesthesie und Intensivmed. 133
69. Kurowski M, Ott H, Herrmann WM (1982) Relationship between EEG, Dynamics and Pharmacokinetics of the Benzodiazepine Lormetazepam. Pharmacopsychiat. 15: 77
70. Langer EJ, Janis JL, Wolfer JA (1975) Reduction of psychological stress in surgical patients. J. Exp. Soc. Psychol. 43: 437
71. Laux L, Glanzmann P, Schaffner P, Spielberger CD (1981) Das State-Trait-Angstinventar. Beltz GmbH, Weinheim
72. Lazarus RS, Opton EM, (1966) The study of psychological stress: a summary of theoretical formulations and experimental findings. In: Spielberger CD (Ed) Anxiety and Behaviour. Academic Press, New York
73. Lazarus RS, Averill JR (1972) Emotion and Cognition: with special reference to anxiety. In: Spielberger CD (Ed) Anxiety Vol II. Academic Press, New York
74. Lee CM, Yeakel AE (1975) Patient refusal of surgery following Innovar premedication. Anesth. Analg. 54: 224
75. Leigh JM, Walker J, Janaganathan P (1977) Effect of pre-operative anaesthetic visit on anxiety. Br. Med. J. 2: 987
76. Levi L, (1967) Biochemische Reaktion bei verschiedenen experimentell hervorgerufenen Gefühlszuständen. In: Kielholz P (Hrsg) Angst psychische und somatische Aspekte. Bern, Stuttgart
77. Lucente FE, Fleck S (1972) A study of hospitalization anxiety in 408 medical and surgical patients. Psychosomatic Medicine 34: 304
78. Luscombe DK (1984) Lormetazepam - Plasma Concentrations in Volunteers Following Sublingual and Oral dosing. In: Hindmarch I, Ott H, Roth T (Ed) Sleep, Benzodiazepines and Performance Experimental Methodologies and Research Prospects. Springer Berlin, Heidelberg, New York, Tokio

79. Martinez-Urrutia A (1975) Anxiety and pain in surgical patients. *J. Consult. Clin. Psychol.* 43: 437
80. Möhlen K, Davies-Osterkamp S (1979) Psychische und körperliche Reaktionen bei Patienten der offenen Herzchirurgie. *Ztschr. Psychosomat. Med. & Psychoanal.* 25: 128
81. Möhler H (1984) Zum Wirkungsmechanismus der Benzodiazepine. *Anaesthesist* 33: 527
82. Müller WE (1982) Molekularer Wirkungsmechanismus der Benzodiazepine. *Münch. med. Wschr.* 124, 41: 879
83. Nisbet HIA, Norris W (1963) Objective measurement of sedation II: A simple scoring system. *Brit. J. Anaest.* 35: 618
84. Norris W, Nisbet HIA (1963) Objective measurement of sedation I: Introduction: General considerations. *Brit. J. Anaest.* 35: 473
85. Norris W, Baird WLM (1967) Preoperative anxiety of the incidence and aetiology. *Brit. J. Anaesth.* 39: 503
86. Norris W (1969) The quantitative assessment of pre-medication. *Brit. J. Anaesth.* 41: 778
87. Ott H (1978) Die Entwicklung von Lormetazepam oral aus klinischer Sicht. Schering AG, Berlin
88. Ott H, Wagner W (1978) Angst - Versuch einer Begriffsklärung und Ableitung eines methodologischen Konzepts zur Angstmessung im Rahmen von Anxiolytika-Prüfungen. *Pharmakopsychiat.* 11: 103
89. Ott H, Wagner W (1979) Angst - Versuch einer Begriffsklärung und Ableitung eines methodologischen Konzepts zur Angstmessung im Rahmen von Anxiolytika-Prüfungen. Schering AG, Berlin/Bergkamen
90. Ott H Doenicke A, Abreß C, Fischl R, Hemmerling K-G, Fichte K (1979) Lormetazepam bei präoperativen Schlafstörungen. Dosisabhängigkeit der Wirkung und Vergleich zu 100 mg Pentobarbital. *Anaesthesist* 28: 29
91. Ott H, Hemmerling K-G, Kugler J, Suttman H, Doenicke A, Tesch C, Straßner G (1980) Amnestische Begleitwirkung nach i.v.-Gabe von Lormetazepam und Flunitrazepam. In: Doenicke A, et al. (Ed) *Lormetazepam - Noctamid*^R Anaesthesiologie und Intensivmedizin 133, Berlin, Heidelberg, New York

92. Park GR, Weir D (1984) A comparison of oral controlled morphine and intramuscular morphine on gastric emptying. *Anaesthesia* 39: 645
93. Paschelke G (1980) Die Entwicklung von Lormetazepam aus pharmakologisch-toxikologischer Sicht. In: Doenicke A, et al (Ed) *Lormetazepam - Noctamid(R). Anaesthesiologie und Intensivmed.* 133, Berlin, Heidelberg, New York
94. Pawlow JP (1953) 20jährige Erfahrungen mit dem objektiven Studium der höheren Nerventätigkeit (des Verhaltens) der Tiere. *Sämtliche Werke, Band III*, Berlin Akademie
95. Pichot P (1967) Die Quantifizierung der Angst. In: Kielholz P (Ed) *Angst als geistesgeschichtl. und naturwissenschaftl. Phänomen* 37. Bern, Stuttgart
96. Ramsey MAE (1972) A survey of pre-operative fear. *Anaesthesia* 27, 4: 396
97. Redmond ED, Huang YH, Suyder DR, Maas JW (1976) Behavioral effects of stimulation of the nucleus locus coeruleus in the stump-tailed Monkey *Macaca arctoides*. *Brain Res.* 116: 502
98. Reinhart K, Dallinger-Stiller G (1983) Respiratorische und schlafinduzierende Wirkungen von Midazolam i.m. als Prämedikation zur Regionalanästhesie. Vergleich mit Diazepam, Promethazin/Pethidin und Placebo. *Anaesthesist* 32: 525
99. Ryan DW (1975) A questionnaire survey of preoperative fears. *Brit. J. Clin. Prac.* 29: 3
100. Sheffer MB, Greifenstein FE (1960) The emotional responses of patients to surgery and anesthesia. *Anesthesiology* 21: 502
101. Shipley RH, Butt JH, Horowitz B, Barbry JE (1978) Preparation for a stressful medical procedure: Effect of amount of stimulus exposure and coping style. *J. Consult. Clin. Psych.* 46: 499
102. Sime AM (1976) Relationship of preoperative fear, type of coping, and information received about surgery to recovery from surgery. *J. Pers. Soc. Psychol.* 34(4): 716
103. Spielberger CD (1972) Anxiety as an emotional state. In: Spielberger CD (Ed) *Anxiety Vol I.* Academic Press, New York

104. Spielberger CD (1972) Conceptual and methodological Issues in Anxiety Research. In: Spielberger CD (Ed) Anxiety Vol II. Academic Press, New York
105. Spielberger CD, Auerbach SM, Wadsworth AP, Dunn TM, Taulbee ES (1973) Emotional reactions to surgery. J. Consult. Clin. Psychol. 40: 33
106. Spintge R, Droh R (1981) Die präoperative Angst. intensivmed. prax. 4: 29
107. Suttman H (1980) Benzodiazepine in der Anaesthesie. In: Doenicke A, et al (Ed) Lormetazepam - Noctamid(R) Anaesthesiologie und Intensivmed. 133, Berlin, Heidelberg, New York
108. Schachter S (1966) The interaction of Cognitive and Physiological Determinants of Emotional State. In: Spielberger CD (Ed) Anxiety and Behaviour. Academic Press, New York
109. Schandry R (1983) Psychophysiologie der Angst. In: Strian F (Ed) Angst. Springer Berlin, Heidelberg, New York
110. Scheunert A, Trautmann A (1976) Lehrbuch der Veterinärphysiologie. Verlag Paul Parey Berlin, Hamburg
111. Schmidt LR (1978) Methoden der psychologischen Operationsvorbereitung. Anästhesie und Intensivmed. 19: 331
112. Strauber BE (1973) Die Wirkung von Pethidin auf Herzmechanik und Kontraktilität des menschlichen Herzens. Klin. Wschr. 51: 1105
113. Steinmüller G (1986) Persönliche Mitteilung. Dissertation, München
114. Tarnow J (1985) Prämedikation. Anästh. Intensivmed. 26: 174
115. Tolksdorf W, Berlin J (1981) Psychische und somatische Auswirkungen der Prämedikation mit Rohypnol, Thalamonal und Placebo in Kombination mit Atropin. Anästh. Intensivther. Notfallmed. 16: 1
116. Tolksdorf W, Berlin J, Rey ER, Schmidt R, Kollmeier W, Storz W, Ridder T, Schaetzle P (1984) Der präoperative Stress. Anaesthesist 33: 212

117. Tolksdorf W, Berlin J (1984) Streßreduktion durch i.m.-Prämedikation mit sechs Einzelsubstanzen. Anästh. Intensivther. Notfallmed. 19: 1
118. Tolksdorf W, Kappa F, Müller P, Jung M (1984) Psychometrische Untersuchungen unter i.v. Benzodiazepinen. Anaesthesist 33: 533
119. Tropon (1984) Atosil^R - vielseitiges Phenothiazin-derivat für Praxis und Klinik. Köln
120. Twycross RG, Lack SA (1983) Symptom Control in far advanced cancer: Pain Relief. Pitman Publishing limited London
121. Ulsamer B (1982) Präoperative Anxiolyse mit Lormetazepam (Noctamid^R) - ein Modell zur Angstmessung bei Regionalanästhesie. Dissertation, München
122. Williams JGL, Jones JR, Williams B (1969) A physiological measure of preoperative anxiety. Psychosom. Med. 31: 522
123. Williams JGL, Jones JR, Workhoven MN, Williams B (1975) The psychological control of preoperative anxiety. Psychophysiology 12: 50
124. Wolfer JA, Davies CE (1970) Assessment of surgical patients' preoperative emotional condition and post-operative welfare. Nurs. Res. 19: 402

Am Ende der Arbeit möchte ich Herrn Prof. Dr. A. Doenicke für die Überlassung des Themas und für seine freundliche Unterstützung meinen Dank aussprechen.

Ebenso bedanke ich mich bei Herrn Dr. H. Suttman für die wissenschaftliche Beratung sowie die erwiesene Hilfsbereitschaft und bei Herrn Dr. H. Ebentheuer für die Hilfe bei der statistischen Auswertung.

Mein Dank gilt auch Chefärztin Frau Dr. A. Stopfinger, die es mir ermöglichte, die Untersuchungen in ihrer Abteilung durchzuführen.

L e b e n s l a u f

- 04.09.1956 Geboren in Moosburg a. d. Isar als erstes Kind des Industriekaufmanns Hans Eder und der Hausfrau Albertine Eder, geborene Hollweck
- 1962 - 1972 Besuch der Volks- und der Realschule in Moosburg; Erwerb der mittleren Reife
- 1972 - 1975 Besuch des Gymnasiums Seligenthal in Landshut; Abschluß mit der Reifeprüfung
- 1976 -1982 Studium der Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München
- Oktober 1982 Abschluß des Studiums und Erhalt der Approbation
- 17.02.1982 Heirat mit dem Tierarzt Dr. med. vet. Manfred Kurpiers
- Mai 1983 bis Tätigkeit als Anästhesistin am Kreis-
Oktober 1985 krankenhaushaus Eggenfelden
- seit Tätigkeit als Anästhesistin am Kreis-
November 1985 krankenhaushaus Freising

